

เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

คำแนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย

อินโวคานา® (อิน-โว-คา-นา)

(คานากลิฟลอสซิน (INN: Canagliflozin))

รูปแบบเม็ด

ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันทควรทราบเกี่ยวกับอินโวคานาคืออะไร?

อินโวคานาสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่สำคัญ ประกอบด้วย:

- การตัดบางส่วนของขาหรือแขน (Amputation) อินโวคานาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตัดบางส่วนของขาได้ การตัดบางส่วนของขาส่วนใหญ่รวมถึงการตัดนิ้วเท้าหรือส่วนของเท้า อย่างไรก็ตาม ยังเคยเกิดการตัดบางส่วนของขาซึ่งรวมถึงบริเวณช่วงขา (Leg) ช่วงล่างและช่วงบนของหัวเข่า บางคนมีการตัดบางส่วนของขาหรือแขนมากกว่า 1 ครั้ง และบางส่วนมีการตัดทั้งสองด้านของร่างกาย

คุณอาจมีความเสี่ยงต่อการตัดขาที่สูงขึ้น ถ้าคุณ:

- มีประวัติเคยผ่านการรักษาด้วยการตัดบางส่วนของขาหรือแขน (Amputation)
- เป็นโรคหัวใจ หรือมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
- เคยมีการอุดตันของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดตีบ ส่วนใหญ่ที่ขา
- มีการทำลายของเส้นประสาท (โรคเส้นประสาท) ที่ขา
- เคยมีแผลที่เท้าหรือมีอาการเจ็บที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน

รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณเริ่มมีอาการปวดหรือมีอาการกดเจ็บ อาการเจ็บ แผล หรือติดเชื้อที่ขา และเท้า แพทย์อาจตัดสินใจหยุดอินโวคานาเป็นเวลาสั้นๆถ้าคุณมีอาการหรืออาการแสดงเหล่านี้

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลเท้าที่เหมาะสม

- ภาวะขาดน้ำ อินโวคานาสามารถส่งผลให้บางคนมีภาวะขาดน้ำ (สูญเสียน้ำในร่างกายปริมาณมากเกินไป) ภาวะขาดน้ำอาจส่งผลให้คุณรู้สึกเวียนศีรษะ หมดสติ หน้ามืดเป็นลม หรืออ่อนแรง โดยเฉพาะเมื่อคุณลุกขึ้นยืน (ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า)

คุณอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีภาวะขาดน้ำถ้าคุณ:

- มีความดันโลหิตต่ำ
- ไข้ยาที่ทำให้ความดันโลหิตต่ำลง ประกอบด้วยยาขับปัสสาวะ (ยาขับน้ำ)
- กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมอาหารให้มีโซเดียม (เกลือ) ต่ำ
- มีปัญหาทางไต
- อายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการป้องกันภาวะขาดน้ำ รวมถึงปริมาณน้ำที่คุณควรดื่มในแต่ละวัน

- ติดเชื้อราในช่องคลอด สตรีที่ใช้อินโวคานาอาจเกิดการติดเชื้อราในช่องคลอดได้ อาการของการติดเชื้อราในช่องคลอดประกอบด้วย:
 - ช่องคลอดมีกลิ่น
 - ตกขาวสีขาวหรือสีออกเหลือง (ตกขาวอาจมีลักษณะเป็นก้อนหรือคล้ายคottage cheese (Cottage cheese))
 - คันบริเวณช่องคลอด
- ติดเชื้อราบริเวณองคชาต (ส่วนหัวองคชาตอักเสบ (balanitis) หรือส่วนหัวองคชาตและหนังหุ้มปลายองคชาตอักเสบ (balanoposthitis)) ผู้ชายที่ใช้อินโวคานาอาจเกิดการติดเชื้อราที่ผิวหนังบริเวณองคชาตได้ ผู้ชายบางคนผู้ที่ไม่ได้ทำการขลิบอาจเกิดการบวมขององคชาตได้ที่ทำให้ยากในการดึงกลับของผิวหนังรอบบริเวณส่วนปลายองคชาต อาการอื่นของการติดเชื้อราบริเวณองคชาตประกอบด้วย:

○ แดง คัน หรือบวมบริเวณองคชาต	○ มีผื่นผิวหนังบริเวณองคชาต
○ หลังสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นเหม็นจากองคชาต	○ เจ็บปวดที่ผิวหนังรอบ ๆ องคชาต

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติถ้าคุณมีอาการของการติดเชื้อราในช่องคลอดหรือบริเวณองคชาต แพทย์อาจแนะนำคุณให้ใช้ยาต้านเชื้อราที่สามารถซื้อเองได้หรือแนะนำให้ซื้อจากเภสัชกร ปรึกษาแพทย์โดยทันทีถ้าคุณใช้ยาต้านเชื้อราที่ซื้อเองแล้วและอาการเหล่านี้ไม่หายไป

อินโวคานาคืออะไร?

- อินโวคานาเป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ใช้สำหรับ:
 - ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 - ใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการที่สำคัญของหลอดเลือดหัวใจ เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดอุดตัน (สโตรก) หรือการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ทราบมาก่อนแล้ว
- ไม่ใช้อินโวคานาในผู้ที่ เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
- ไม่ใช้อินโวคานาในผู้ที่มีภาวะไตแอบิติกคิโทแอซิดอซิซิส (diabetic ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มขึ้น)
- ยังไม่ทราบถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของอินโวคานาในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ใครไม่ควรใช้อินโวคานา?

ห้ามใช้อินโวคานา ถ้าคุณ:

- แพ้ต่อกานากลิฟลอสซินหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในอินโวคานา ดูที่ส่วนท้ายของคำแนะนำการใช้ยาฉบับนี้สำหรับรายการส่วนประกอบในอินโวคานา อาการของปฏิกิริยาแพ้ต่อกานากลิฟลอสซินอาจประกอบด้วย:
 - ผื่นผิวหนัง
 - เกิดรอยปื้นแดงและนูนบนผิวหนัง (ลมพิษ)
 - มีอาการบวมบริเวณใบหน้าริมฝีปาก ปาก ลิ้น และลำคอ ซึ่งส่งผลทำให้หายใจหรือกลืนลำบาก
- มีปัญหาทางไตขั้นรุนแรง หรือกำลังได้รับการล้างไต

ฉันควรแจ้งอะไรกับแพทย์ก่อนใช้อินโวคานา?

ก่อนคุณใช้อินโวคานา แจ้งแพทย์ถ้าคุณ:

- มีประวัติเคยผ่านการรักษาด้วยการตัดบางส่วนของขาหรือแขน (Amputation)
- เป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
- เคยมีการอุดตันหรือตีบของหลอดเลือด โดยเฉพาะที่ขา
- มีการทำลายเส้นประสาท (โรคเส้นประสาท) ที่ขา
- เคยมีแผลที่เท้าหรือมีอาการเจ็บที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน
- มีปัญหาทางไต
- มีปัญหาทางตับ
- มีประวัติการติดเชือบริเวณทางเดินปัสสาวะ หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
- กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมอาหารให้มีโซเดียม (เกลือ) ต่ำ แพทย์อาจเปลี่ยนการควบคุมอาหาร หรือขนาดยาอินโวคานา
- กำลังจะได้รับการผ่าตัด
- กำลังมีการรับประทานน้อย เนื่องจากเจ็บป่วย ผ่าตัด หรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมอาหาร
- มีหรือเคยมีปัญหาด้านตับอ่อน ประกอบด้วยตับอ่อนอักเสบ หรือตับอ่อนได้รับการผ่าตัด
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมาก หรือดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ (การดื่มแบบยกหมดแก้ว (“binge” drinking))
- เคยเกิดปฏิกิริยาการแพ้ต่ออินโวคานา
- มีภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
- กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ อินโวคานาอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ถ้าคุณมีการตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำลังใช้อินโวคานา ให้รีบแจ้งแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางที่ดีที่สุดในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณในระหว่างที่คุณกำลังตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร หรือวางแผนจะให้นมบุตร อินโวคานาอาจผ่านสู่น้ำนมได้ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกของคุณ ปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางที่ดีที่สุดที่จะให้อาหารทารกของคุณถ้าคุณกำลังใช้อินโวคานา ห้ามให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้อินโวคานา

แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทุกตัวที่คุณกำลังใช้อยู่ รวมถึงยาที่แพทย์สั่ง และยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และยาสมุนไพร

อินโวคานาอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาตัวอื่น และยาตัวอื่นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอินโวคานา ให้แจ้งแพทย์โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังใช้:

- ยาขับปัสสาวะ (ยาขับน้ำ)
- ไรแฟมพิน (ใช้ในการรักษาหรือป้องกันวัณโรค)
- ฟินิโตอิน หรือฟีโนบาร์บิทัล (ใช้ในการควบคุมอาการชัก)
- ไรโทนาเวียร์ (ใช้ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี)
- ดิจ็อกซิน (ใช้ในการรักษาโรคหัวใจ)

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับรายการยาเหล่านี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ายานของคุณอยู่ในรายการดังกล่าวหรือไม่

คุณควรทราบว่า คุณกำลังใช้ยาตัวใดอยู่ ให้เก็บรายการยาไว้ และแสดงให้แพทย์หรือเภสัชกรดูเมื่อคุณได้รับยาตัวใหม่

ฉันควรใช้อินโวคานาอย่างไร?

- ใช้อินโวคานาโดยการรับประทาน วันละ 1 ครั้ง ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
- แพทย์จะเป็นคนแจ้งให้คุณว่าคุณต้องรับประทานอินโวคานาปริมาณเท่าไรและเวลาใด แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาของคุณถ้ามีความจำเป็น
- จะเป็นการดีที่สุดถ้า ให้รับประทานอินโวคานาก่อนอาหารเช้าแรกของวัน
- แพทย์อาจแจ้งคุณให้รับประทานอินโวคานาร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานตัวอื่น ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นเมื่อใช้อินโวคานาร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานบางชนิด ดูหัวข้อ “อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินโวคานามีอะไรบ้าง?”
- ถ้าคุณลืมนับรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ ถ้าเป็นเวลาใกล้ถึงมื้อยาถัดไปให้ข้ามมื้อที่ลืมนับและรับประทานยามื้อถัดไปตามเวลาปกติ ห้ามเพิ่มขนาดอินโวคานาเป็น 2 เท่าในเวลาเดียวกัน ปรึกษาแพทย์ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลืมนับรับประทานยา
- ถ้าคุณรับประทานอินโวคานาในขนาดที่มากเกินไป รีบแจ้งแพทย์หรือไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที

- เมื่อร่างกายของคุณอยู่ในภาวะเครียดบางชนิด เช่น มีไข้ ได้รับบาดเจ็บ (เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์) ติดเชื้อ หรือผ่าตัด อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณยารักษาโรคเบาหวาน ปรึกษาแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
- ให้ปฏิบัติตามการควบคุมอาหาร และตารางการออกกำลังกายของคุณที่แพทย์สั่งในระหว่างที่กำลังใช้อินวอคานา
- ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดตามที่แพทย์สั่ง
- อินวอคานาอาจส่งผลให้การตรวจปริมาณน้ำตาล (กลูโคส) ในปัสสาวะของคุณมีค่าบวก
- แพทย์อาจทำการตรวจเลือดบางชนิดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้อินวอคานาและทำการตรวจเลือดระหว่างทำการรักษาถ้ามีความจำเป็น แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาอินวอคานาโดยขึ้นกับผลจากการตรวจเลือดของคุณ
- แพทย์จะตรวจเบาหวานโดยการตรวจเลือดด้วยวิธีปกติ ประกอบด้วยระดับน้ำตาลในเลือด และค่าฮีโมโกลบิน A_{1c}

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินวอคานามีอะไรบ้าง?

อินวอคานาอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ประกอบด้วย:

ดูหัวข้อ “ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับอินวอคานาคืออะไร?”

- ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้น) เคยเกิดภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 ในระหว่างการรักษาด้วยอินวอคานา ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) เป็นภาวะที่รุนแรงซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) สามารถเกิดขึ้นร่วมกับการใช้อินวอคานา แม้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให้หยุดใช้อินวอคานาและรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้:
 - คลื่นไส้
 - อาเจียน
 - ปวดบริเวณท้อง (หรือบริเวณช่องท้อง)
 - เหนื่อย
 - หายใจลำบาก

โรคเนื้อเน่าบริเวณระหว่างและรอบทวารหนักและอวัยวะเพศ (necrotizing fasciitis) เกิดในผู้หญิงและผู้ชายที่ใช้ยาอินโวคานา โรคเนื้อเน่าบริเวณระหว่างและรอบทวารหนักและอวัยวะเพศอาจทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาจต้องผ่าตัดหลายครั้ง และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีไข้ หรือรู้สึกอ่อนเพลียมาก เหนื่อยหรือรู้สึกไม่สบาย (malaise) และคุณมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ในบริเวณระหว่างและรอบทวารหนักและอวัยวะเพศ

○ ปวดหรือตึง

○ บวม

○ ผิวน้ำแดง (erythema)

- ปฏิบัติการแพทย์ที่รุนแรง ถ้ามีอาการของปฏิบัติการแพทย์ที่รุนแรง ให้หยุดใช้อินโวคานาและรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีหรือไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที ดูหัวข้อ “ใครไม่ควรใช้อินโวคานา?” แพทย์อาจให้ยาคุณสำหรับปฏิบัติการแพทย์และสั่งจ่ายยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานตัวอื่น
- กระจุกหูก (แตก) การกระจุกหูกหรือกระจุกแตกเคยพบในผู้ป่วยที่ใช้อินโวคานา ปรีกษาแพทย์เกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการกระจุกหูกหรือกระจุกแตก

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของอินโวคานา ประกอบด้วย:

- ติดเชื้อราในช่องคลอด และติดเชื้อราบริเวณองคชาติ (ดูหัวข้อ “ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับอินโวคานาคืออะไร?”)
- การปรับสภาวะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยมีความต้องการปรับสภาวะอย่างเร่งด่วนบ่อยมากกว่าปกติ ปรับสภาวะในปริมาณมาก หรือในเวลากลางคืน

แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่รบกวนคุณหรือไม่หายไป อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินโวคานา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ให้สอบถามแพทย์เพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการข้างเคียง คุณอาจรายงานอาการข้างเคียงต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยได้

คุณอาจรายงานอาการข้างเคียงต่อบริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัดได้

ฉันจะเก็บรักษาอินโวคานาอย่างไร?

- ห้ามเก็บอินโวคานาที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส

- ดูวันหมดอายุบนกล่องยาต้านนอก
- เก็บอินโวคานาและยาทุกชนิดให้พ้นจากมือเด็ก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อินโวคานาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ยาในบางครั้งอาจถูกสั่งจ่ายด้วยวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำแนะนำการใช้ยา ห้ามใช้อินโวคานาสำหรับภาวะที่แพทย์ไม่ได้ระบุ ห้ามให้อินโวคานาแก่ผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะมีอาการเดียวกับคุณ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาได้

คำแนะนำการใช้ยาดังนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับอินโวคานา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ปรึกษาแพทย์ คุณสามารถสอบถามเภสัชกรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินโวคานาที่มีการระบุสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินโวคานา โปรดอ่านเอกสารกำกับยาฉบับเต็มที่เว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

ส่วนประกอบของอินโวคานามีอะไรบ้าง?

ตัวยาสำคัญ: คานากลิฟลอสิน

สารประกอบที่ไม่มีฤทธิ์: ครอสคาร์เมลโลสไซเตียม ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส แลคโตสแอนไฮดรัส แมกนีเซียมสเตียเรต และไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส นอกจากนี้ ส่วนเคลือบเม็ดยาประกอบด้วยไฮดรอกซีเซลลูโลส โพลีเอทิลีนไกลคอล (พีอีจี) โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ทัลค์ และไทเทเนียมไดออกไซด์

ลักษณะและส่วนประกอบของภาชนะบรรจุ: ยาเม็ดบรรจุแยกเม็ดในแผงบลิสเตอร์ที่ผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)/อะลูมิเนียมฟอยล์ จำนวน 10 เม็ดต่อ 1 แผงบลิสเตอร์ ในกล่องยาจะมีการบรรจุดังนี้: 10 เม็ด (1 แผงบลิสเตอร์) 30 เม็ด (3 แผงบลิสเตอร์) 90 เม็ด (9 แผงบลิสเตอร์) และ 100 เม็ด (10 แผงบลิสเตอร์)

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
2. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยที่มีภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง

3. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยานี้
4. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง หิวน้ำผิดปกติ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก สับสน แม้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่มาก ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเนื่องจากอาจเกิดอาการ diabetic ketoacidosis
6. ควรระมัดระวังการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่อวัยวะเพศ และระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตโดย	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
อินโวคานา 100 มิลลิกรัม	Janssen Ortho, LLC Gurabo ประเทศเปอร์โตริโก	1C 36/58 (NC)	7 เมษายน 2558
อินโวคานา 300 มิลลิกรัม	Janssen Ortho, LLC Gurabo ประเทศเปอร์โตริโก	1C 37/58 (NC)	7 เมษายน 2558
อินโวคานา 100 มิลลิกรัม	Janssen Cilag S.p.A. Latina ประเทศอิตาลี	1C 15024/61 (NC)	17 เมษายน 2561
อินโวคานา 300 มิลลิกรัม	Janssen Cilag S.p.A. Latina ประเทศอิตาลี	1C 15025/61 (NC)	17 เมษายน 2561

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด ตุลาคม 2561

ได้รับลิขสิทธิ์จาก Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์: 02-792-7200

โทรสาร: 02-792-7222