

ลิวิโทราซีแอม
ความแรง 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชนิดน้ำสำหรับรับประทาน
ชุดการคำ EPILOG (ORAL SOLUTION)
(อีพิล็อก ชนิดน้ำ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลิวิโทราซีแอม (Levetiracetam)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการชักในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มอนุพันธ์ของไพรโรลิโดน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคไต
 - มีภาวะไตช้า หรือมีพัฒนาการทางเพศผิดปกติ
 - เคยได้รับยากันชักแล้วซึมเศร้าหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
 - กำลังใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรอื่นร่วมด้วย
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือให้นมบุตร
- ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่อง
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ โดยหากได้รับยาแล้วยังมีอาการชักอยู่ ให้รีบแจ้งแพทย์
- ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม ไม่ควรขับขียานพาหนะ ทำงานกับเครื่องจักร หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้ และต่อมน้ำเหลืองโต
- ปัสสาวะไม่ออก บวมที่ขา-ข้อเท้า น้ำหนักเปลี่ยน

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล ตื่นกลัว หงุดหงิดง่าย
- บ้านหมุน มึนงง สับสน หลงลืม เดินลำบาก มือสั่น
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง ท้องเสีย
- ไอ ปวดหัว ตามัว หรือมองเห็นภาพซ้อน
- กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้อ
- ผมร่วง คับบนผิวหนัง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ไม่ควรใช้ยานี้หลังจากเปิดใช้แล้ว 30 วัน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น้ำใส ไม่มีสี รสอ่อน
- ตัวยาสสำคัญ ลิวิโทราซีแอม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ กรดซิตริก, โซเดียม ซิเตรต, กลีเซอริน, สารละลายมัลติทอล, แอมโมเนียมไกลซีอาร์ไอซินเนต, แอสซัลเฟม โปแทสเซียม, เมทิลพาราเบน, โพรพิลพาราเบน, รสอ่อนและน้ำ

ผู้ผลิต: บริษัท ยูเมต้า จำกัด

26/18-21 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา
 หมู่ที่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10230

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ :
 มีนาคม พ.ศ. 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- http://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.aspx

คำเตือน (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)

- ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขียานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้
- ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
- ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร