

บอทีโซมิบ

ความแรง 1 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดผงละลายน้ำสำหรับฉีด
ชื่อการค้า BORVIZ® (บอวิซ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า บอ-ที-โซ-มิบ (Bortezomib)
- เป็นยายับยั้งการทำงานของเซลล์มะเร็งและทำให้เซลล์มะเร็งตาย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว ชนิดมัลติโบลมา และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแมนเทิลเซลล์

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีความผิดปกติเกี่ยวกับปอด หรือหัวใจ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- **แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้**
 - เป็นโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง
 - ดับทำงานผิดปกติระดับปานกลาง หรือรุนแรง
 - มีอาการชา ปวดแปลบที่มือ หรือเท้า
 - เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวต่ำ
 - เลือดออกง่าย เกล็ดเลือดต่ำ
 - ไตทำงานผิดปกติ
 - เคยชัก
 - กำลังเป็นงูสวัด
 - กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว สับสน ตามัว ตาพร่า เห็นภาพเบลอ ภาพซ้อน
 - ความจำเสื่อม การคิดมีปัญหา เดินลำบาก สูญเสียการมองเห็น **เพราะ**เป็นอาการของการติดเชื้อรุนแรงที่สมอง
 - เคยได้รับยานี้แล้วมีอาการเป็นลม เวียนหัว

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านตั้งครรภ์ มีแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของทารก
- เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี **ไม่ควรใช้ยานี้** **เพราะ**ยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้** เช่น
 - ยาดีโทโคนาโซล ซึ่งใช้รักษาเชื้อรา
 - ยาริทอนาเวียร์ ซึ่งใช้รักษาโรคเอดส์
 - ยาไรแฟมพิซิน ซึ่งใช้รักษาวัณโรค
 - ยารักษาโรคลมชัก
 - ยารักษาเบาหวาน**“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน โดยยานี้สำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำเท่านั้น
- **ห้าม**ฉีดทางไขสันหลังเด็ดขาด
- แพทย์อาจจะให้ท่านใช้ยาป้องกันหรือรักษาการติดเชื้อ เพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อระหว่างใช้ยานี้

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร หากท่านลืมมารับยา หรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

3.3 ถ้าหากฉีดยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม ตาพร่า มือเท้าเย็น เหงื่อออกมาก หายใจเร็ว เหนื่อย หรือสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงต้องคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาที่ใช้ยานี้ และต้องคุมกำเนิดไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย
- **ห้ามให้นมทารก** ด้วยน้ำนมของมารดาที่กำลังใช้ยานี้ และหลังหยุดใช้ยานี้ไปอีก 2 เดือน
- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระวังการขับรถ ขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ผู้ที่ใช้ยานี้และกำลังกินยารักษาเบาหวานร่วมด้วย ควรระวังอาการน้ำตาลต่ำ และควรติดตามระดับน้ำตาลในเลือด

5. อันตรายจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการเช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจสั้น
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
 - มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ
 - กล้ามเนื้อเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก
 - ชัก ปวดหัว สับสน ตาพร่า ตามัว เห็นภาพเบลอ วงงวม ชิม เดินลำบาก
- “ต้องรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที”**

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการเช่น

- มีอาการชา ปวดแปลบที่มือ หรือเท้า
- มือ เท้า หัวเข่า หรือขาตื้อกลางบวม
- หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดต่ำ เป็นลม
- ชีต อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- ติดเชื้อง่าย มีอาการคล้ายเป็นหวัด
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
- ท้องอืด ท้องผูก หรือท้องร่วง

- แผลในปาก
 - ผอมร่วง หรือผมมีลักษณะผิดปกติ
- "ให้รอดูอาการ แต่ถ้าทนไม่ไหวหรือมีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส อย่าแกะยาออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์และวางทิ้งไว้ เพราะอาจโดนแสง
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ขวดแก้วใสบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวนวล สำหรับสารละลายสำหรับฉีด
- ตัวยาสำคัญ บอรัทีโซมิม 3.5 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แมนนิทอล และเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล์

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ผู้ผลิต : INTAS Plot NO.5/6/7 Pharmez Shrkhej/Bavla Highway AHMEDABAD GUJARAT INDIA

ผู้นำเข้า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 เมษายน 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

- ขวดแก้วใสบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวนวล สำหรับสารละลายสำหรับฉีด
- ตัวยาสําคัญ บอร์โทโซมิบ 3.5 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แมนนิทอล และ เทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล์

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น