

**พาราเซตามอล**  
**160 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิิตร**  
**ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น**  
**CHILDREN'S TYLENOL®**

**คำเตือน**

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำตาลหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

**1. ยานี้คือยาอะไร**

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่**

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายเสียชีวิตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องจีซิกซ์พีดี G6PD หรือกำลังกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน หรือเป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์
- การใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน ให้ปรึกษาแพทย์

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

**ขนาดยา**

- กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ตามขนาดยาในตาราง

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ช้อนชาตวงยา	ถ้วยตวงยา
ตั้งแต่ 6 ถึง 8	ครึ่งช้อน	2.5 มิลลิิตร
มากกว่า 8 ถึง 11	สามส่วนสี่ช้อน	3.75 มิลลิิตร
มากกว่า 11 ถึง 16	หนึ่งช้อน	5 มิลลิิตร
มากกว่า 16 ถึง 22	หนึ่งช้อนครึ่ง	7.5 มิลลิิตร
มากกว่า 22 ถึง 32	สองช้อน	10 มิลลิิตร

**วิธีใช้ยา**

- เขย่าขวดก่อนใช้ยา
- ตวงยาและป้อนยาด้วยถ้วยตวงยา

**3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมาก และได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยา**

- ไม่กินยาติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1**

หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำตาลหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

**5.2**

หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

ยานี้เป็นยาน้ำแขวนตะกอนสีแดง แต่งรสเชอร์รี่ ปราศจากแอลกอฮอล์และแอสไพรีน ใน 5 มิลลิิตรประกอบด้วยพาราเซตามอล 160 มิลลิกรัม

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ  
หากผู้ใช้ส่งคืนทางไปรษณีย์หรือส่งมอบ

เอกสารนี้ได้รับปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2561

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
166 หมู่ 16 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางปลามะลิ  
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนเทอดไท แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10520  
โทรศัพท์: 02-792-7200  
โทรสาร: 02-792-7222