

- 1 **เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย**
- 2 ยาเม็ดเคลือบฟิล์มลิกเซียนา (Lixiana®) ขนาดความแรง 15 มก.
- 3 ยาเม็ดเคลือบฟิล์มลิกเซียนา (Lixiana®) ขนาดความแรง 30 มก.
- 4 ยาเม็ดเคลือบฟิล์มลิกเซียนา (Lixiana®) ขนาดความแรง 60 มก.
- 5 ยาอีติดอกซาแบน (ในรูปเกลือ tosilate)

6 ผลิตภัณฑ์ยานี้ต้องอยู่ภายใต้การตรวจติดตามเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุหาข้อมูลความปลอดภัยใหม่ได้

7 โปรดอ่านเอกสารกำกับยาทั้งหมดอย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้ยานี้

- 8 ● เก็บเอกสารกำกับยานี้ไว้ ท่านอาจต้องการอ่านเอกสารกำกับยานี้
- 9 ● ถ้าท่านมีคำถามใดๆเพิ่มเติม กรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- 10 ● ยานี้สั่งจ่ายสำหรับท่าน ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่นเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้แม้ว่าอาการแสดงของผู้อื่นจะเหมือนกับ
- 11 ท่าน
- 12 ● ถ้าอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ เป็นรุนแรงขึ้นหรือถ้าท่านสังเกตพบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ กรุณาแจ้งแพทย์หรือ
- 13 เภสัชกรแม้ว่าอาการเหล่านั้นจะไม่มีระบุในเอกสารกำกับยานี้ก็ตาม

14 เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้:

- 15 1. ลิกเซียนาคือยาอะไรและใช้สำหรับรักษาโรคอะไร
- 16 2. สิ่งที่ต้องทราบก่อนรับประทานลิกเซียนา
- 17 3. ลิกเซียนาใช้อย่างไร
- 18 4. อาการไม่พึงประสงค์ของลิกเซียนา
- 19 5. ควรเก็บลิกเซียนาอย่างไร
- 20 6. ข้อมูลเพิ่มเติม

21 1. ลิกเซียนาคือยาอะไรและใช้สำหรับรักษาโรคอะไร

22 ลิกเซียนา ประกอบไปด้วยตัวยาสำคัญที่ชื่อว่า อีติดอกซาแบน ซึ่งอยู่ในกลุ่มของยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยานี้ช่วย

23 ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โดยไปยับยั้ง Factor Xa ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการสร้างลิ่มเลือด

24 การใช้ลิกเซียนาในผู้ป่วยผู้ใหญ่

- 25 - ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และภาวะลิ่มเลือดอุดตันในกระแสเลือด ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มี
- 26 ภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากลิ้นหัวใจ (Non Valvular Atrial Fibrillation: NVAf)
- 27 ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เช่น หัวใจล้มเหลวแบบมีเลือดคั่ง ความดันโลหิตสูง อายุ ≥ 75 ปี
- 28 โรคเบาหวาน เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน หรือโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA)
- 29 - รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำส่วนลึก (DVT) และภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำในปอด (PE) และการ
- 30 ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำและภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำในปอดที่กลับเป็นซ้ำ

31 2. สิ่งที่ต้องทราบก่อนรับประทานลิกเซียนา

32 ห้ามใช้ยาลิกเซียนาในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 33 - หากท่านแพ้ยาอีต็อกซาแบนหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยาลิกเซียนา (ตามรายการในข้อ 6)
- 34 - หากท่านกำลังมีภาวะเลือดออก
- 35 - หากท่านป่วยเป็นโรคหรือมีภาวะต่างๆ ที่จะเพิ่มความเสี่ยงของอาการเลือดออกอย่างรุนแรง (เช่น แผลใน
- 36 กระเพาะอาหาร อาการบาดเจ็บหรือเลือดออกในสมอง เพิ่งได้รับการผ่าตัดสมองหรือตา)
- 37 - หากท่านกำลังใช้ยาที่ป้องกันการอุดตันของลิ่มเลือด (เช่น วอร์ฟาริน ดาปิกาเทรน ริวาโรซาแบน อะพิซา
- 38 แบน หรือเฮพาริน) นอกจากในขณะที่กำลังเปลี่ยนยาที่ใช้ในการรักษา หรือเมื่อมีการให้ยาเฮพารินชนิด UFH
- 39 ในขนาดที่มีความจำเป็นต่อการคงสภาพการเปิดท่อสวนหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำส่วนกลาง
- 40 - หากท่านเป็นโรคตับที่มีความเสี่ยงของภาวะเลือดออกเพิ่มขึ้น
- 41 - หากท่านไม่สามารถควบคุมระดับความดันเลือดได้
- 42 - หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

43 คำเตือนและข้อควรระวัง

44 ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาลิกเซียนา

45 ต้องการการดูแลเป็นพิเศษสำหรับยาลิกเซียนา

- 46 - หากท่านมีความเสี่ยงของภาวะเลือดออกเพิ่มขึ้น หรือมีสภาวะต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - 47 ○ โรคไตระยะสุดท้าย หรือได้รับการฟอกไต
 - 48 ○ โรคตับระยะรุนแรง
 - 49 ○ ภาวะเลือดออกผิดปกติ
 - 50 ○ ปัญหาที่เส้นเลือดด้านหลังดวงตา (โรคจอตาอักเสบ)
 - 51 ○ เคยมีภาวะเลือดออกในสมอง (เลือดออกในกระโหลกศีรษะหรือที่เนื้อสมอง)
 - 52 ○ ปัญหาที่เส้นเลือดในสมองหรือไขสันหลัง
 - 53 - หากท่านได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม
- 54 ยาลิกเซียนาขนาด 15 มก. ถูกใช้เมื่อเปลี่ยนจากยาลิกเซียนา 30 มก. มาใช้ยาต้านไวตามิน เค (เช่น ยาวอร์ฟาริน)
- 55 เท่านั้น (ดูหัวข้อ 3. ลิกเซียนาใช้อย่างไร)
- 56 - หากท่านจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด
- 57 การรับประทานยาลิกเซียนาให้ตรงตามเวลาที่แพทย์สั่งทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นไปได้ควรหยุดยาลิกเซียนาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดและแพทย์จะกำหนดระยะเวลาในการเริ่มใช้ยาลิกเซียนาใหม่
- 58 ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
- 59 ไม่แนะนำให้ใช้ยาลิกเซียนาในเด็กและวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 18 ปี เพราะไม่มีข้อมูลการใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น
- 60 ยาอื่นๆ และยาลิกเซียนา
- 62 แจ้งกับแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านกำลังใช้ยา เคยใช้ยา หรืออาจต้องใช้ยาดังต่อไปนี้:
- 63 - ยาด้านเชื้อราบางตัว (เช่น คีโตโคนาโซล)
 - 64 - ยารักษาหัวใจเต้นผิดปกติ (เช่น โดรอนดาโรน ควินิดีน เวนาพามีล)

- 65 - ยาชนิดอื่นๆ ที่ลดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (เช่น เฮพาริน โคลพิโดเกรล หรือ ยาต้านไวตามิน เค เช่น วอร์ฟาริน อะ
66 ซิโนคูมารอล และเฟนโพรคูมอน)
67 - ยาต้านจุลชีพ (เช่น อีริโทรมัยซิน)
68 - ยาที่ใช้ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะหลังจากการปลูกถ่ายอวัยวะ (เช่น ไซโคลสปอริน)
69 - ยาท้านการอักเสบและบรรเทาปวด (เช่น นาพริออกเซน หรือ กรดอะเซติลซาลิซิลิก (แอสไพริน))
70 - ยาท้านโรคซึมเศร้า กลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะการดูดกลับเซโรโทนิน (SSRIs) หรือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการ
71 ดูดกลับเซโรโทนินและนอร์อิพิเนฟริน (SNRIs)

72 ให้แจ้งแพทย์ของท่านก่อนใช้ยาอีกเสียนา เพราะยาเหล่านี้อาจเพิ่มผลของยาอีกเสียนาและโอกาสในการเกิดอาการ
73 เลือดออกที่ไม่ต้องการ แพทย์ของท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าท่านควรใช้ยาอีกเสียนา และควรได้รับการติดตามอย่าง
74 ใกล้ชิด

75 หากท่านกำลังใช้ยาดังต่อไปนี้:

- 76 - ยาบางตัวที่ใช้ในการรักษาโรคลมชัก (เช่น ยาเฟนิทอยน์ ยาคาร์บามาซีพีน ยาฟีโนบาร์บิทัล)
77 - St. John's Wort เป็นสมุนไพรที่ใช้ในภาวะวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าแบบอ่อนๆ
78 - ยาไรแฟมพิซิน ยาปฏิชีวนะ

79 ให้แจ้งแพทย์ของท่านด้วย หากท่านใช้ยาต่างๆ ที่กล่าวมาด้านบน เนื่องจากผลการรักษาของยาอีกเสียนาอาจลดลง
80 แพทย์ของท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าท่านควรใช้ยาอีกเสียนา และท่านควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด

81 สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

82 ไม่ควรใช้ยาอีกเสียนา หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร หรือมีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ ควรใช้ยา
83 คุณกำเนิดในขณะที่ใช้ยาอีกเสียนา และหากตั้งครรภ์ระหว่างที่ใช้ยาอีกเสียนา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเพื่อให้แพทย์
84 เป็นผู้ตัดสินใจว่าควรทำการรักษาอย่างไรต่อไป

85 การขับชี่ยานพาหนะและการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

86 ยาอีกเสียนาไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการขับชี่และการใช้เครื่องจักรกล

87 3. ลิกเสียนาใช้อย่างไร

88 ท่านควรใช้ยาอีกเสียนาให้ตรงตามคำสั่งของแพทย์หรือเภสัชกร ตรวจสอบการใช้กับแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านไม่แน่ใจ
89 ต้องใช้ยาเท่าไร

90 ขนาดยาที่แนะนำให้ใช้ คือ ยาเม็ดขนาด 60 มก. 1 เม็ด วันละครั้ง

- 91 ○ หากท่านมีการทำงานของไตบกพร่อง ควรปรับลดขนาดยาของลิกเสียนาขนาด 30 มก. วันละครั้ง
92 ○ หากท่านน้ำหนัก 60 กก. หรือน้อยกว่า ขนาดยาที่แนะนำคือ ยาเม็ดขนาด 30 มก. วันละครั้ง
93 ○ หากแพทย์ของท่านสั่งยาที่ยับยั้งพี-ไกลโคโปรตีน ได้แก่ ไซโคลสปอริน โดรนาโดรอน อีริโทรมัยซิน
94 หรือคีโตโคนาโซล ขนาดยาที่แนะนำคือ ยาเม็ดขนาด 30 มก. วันละครั้ง

95 ต้องรับประทานยาอย่างไร

- 96 - ควรกลืนยาอีกเสียนาพร้อมน้ำ
97 - สามารถรับประทานยาอีกเสียนาพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่าง

98 หากแพทย์ต้องการเปลี่ยนยาด้านการแข็งตัวของเลือดควรปฏิบัติดังนี้:

- 99 - เปลี่ยนจากยาต้านไวตามิน เค (เช่น ยาวอร์ฟาริน) มาใช้ยาalikเซียนา
100 ให้หยุดยาต้านไวตามิน เค (เช่น วอร์ฟาริน) แพทย์จะต้องวัดค่าของเลือดและแนะนำว่าจะเริ่มใช้ยาalikเซียนา
101 เมื่อไร
- 102 - เปลี่ยนจากยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานตัวอื่นที่ไม่ใช่ยาต้านไวตามิน เค (ดาบิกาแทรน ริวาโร
103 ซาแบน หรือ อะพิซาแบน) มาใช้ยาalikเซียนา
104 หยุดใช้ยาตัวอื่นๆ ที่ใช้อยู่ (เช่น ดาบิกาแทรน ริวาโรซาแบน หรือ อะพิซาแบน) และเริ่มใช้ยาalikเซียนาแทน
105 ในเวลาที่ต้องรับประทานยาชนิดเดิมในมือถัดไป
- 106 - เปลี่ยนจากยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดฉีด (เช่น ยาเฮพาริน) มาใช้ยาalikเซียนา
107 หยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือด (เช่น เฮพาริน) และเริ่มใช้ยาalikเซียนาในเวลาที่ต้องใช้ยาชนิดเดิมในเวลา
108 ถัดไป
- 109 - เปลี่ยนจากยาalikเซียนา ไปใช้ยาต้านไวตามิน เค (เช่น ยาวอร์ฟาริน)
110 หากท่านใช้ยาalikเซียนาขนาด 60 มก.:
111 แพทย์จะสั่งให้ลดขนาดยาalikเซียนาที่ท่านใช้ลงเหลือ 30 มก. วันละครึ่ง และใช้ร่วมกับยาต้านไวตามิน เค (เช่น
112 วอร์ฟาริน) แพทย์จะต้องทำการวัดค่าของเลือดและสั่งให้ท่านหยุดยาalikเซียนา
113 หากท่านใช้ยาalikเซียนาขนาด 30 มก.:
114 แพทย์จะสั่งให้ลดขนาดยาalikเซียนาที่ท่านใช้ลงเหลือ 15 มก. วันละครึ่ง และใช้ร่วมกับยาต้านไวตามิน เค (เช่น
115 วอร์ฟาริน) แพทย์จะต้องทำการวัดค่าของเลือดและสั่งให้ท่านหยุดยาalikเซียนา
- 116 - เปลี่ยนจากยาalikเซียนา มาใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานตัวอื่นที่ไม่ใช่ยาต้านไวตามิน เค (ดา
117 บิกาแทรน ริวาโรซาแบน หรือ อะพิซาแบน)
118 หยุดใช้ยาalikเซียนา และเริ่มใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานตัวอื่นที่ไม่ใช่ยาต้านไวตามิน เค
119 (เช่น ดาบิกาแทรน ริวาโรซาแบน หรือ อะพิซาแบน) แทนในเวลาที่ต้องรับประทานยาalikเซียนาในมือถัดไป
- 120 - เปลี่ยนจากยาalikเซียนา มาใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดฉีด (เช่น ยาเฮพาริน)
หยุดใช้ยาalikเซียนา และเริ่มใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดฉีดแทนในเวลาที่ต้องรับประทานยาalikเซียนา
ในมือถัดไป
- 121 ผู้ป่วยที่ทำการเปลี่ยนจังหวะการเต้นของหัวใจให้กลับเป็นปกติ (cardioversion)
122 หากท่านมีภาวะหัวใจผิดปกติและต้องการเปลี่ยนจังหวะการเต้นของหัวใจให้กลับเป็นปกติ (cardioversion) ท่านต้อง
123 รับประทานยาalikเซียนาตามเวลาที่แพทย์แนะนำ เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดในสมองและ อุดตันตามหลอดเลือด
124 เลือดในร่างกาย

- 125 หากท่านใช้ยาลีกเซียนามากกว่าที่แพทย์สั่ง
- 126 แจ้งแพทย์ทันทีว่าท่านใช้ยาลีกเซียนาไปมากกว่าที่แพทย์สั่ง
- 127 ถ้าท่านใช้ยาลีกเซียนามากกว่าที่แนะนำ ความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกของท่านจะเพิ่มขึ้น
- 128 หากท่านลืมรับประทานยาลีกเซียนา
- 129 ท่านควรรับประทานยาทันที และรับประทานยาในวันต่อไป วันละครั้งตามปกติ ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าใน
- 130 วันเดียวกันเพื่อชดเชยมื้อที่ขาดยา
- 131 หากท่านหยุดรับประทานยาลีกเซียนา
- 132 ห้ามหยุดยาลีกเซียนาเองโดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์ เนื่องจากยานี้ใช้ในการรักษาและป้องกันสภาวะที่รุนแรง
- 133 ถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ กรุณาสอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร
- 134 **4. อาการไม่พึงประสงค์ของยาลีกเซียนา**
- 135 ยานี้สามารถทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้เช่นเดียวกับยาชนิดอื่น ถึงแม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนก็ตาม
- 136 เช่นเดียวกับยากลุ่มที่คล้ายกัน (ยาลดการอุดตันของลิ้มเลือด) ยาลีกเซียนาอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกรุนแรงถึงแก่ชีวิต
- 137 ได้ ในบางรายอาจไม่เห็นอาการเลือดออกอย่างชัดเจน
- 138 หากท่านเกิดภาวะเลือดออกที่ไม่สามารถหยุดได้เอง หรือมีอาการเลือดออกอย่างมาก (ภาวะอ่อนแออย่างมาก
- 139 เหนื่อยล้า ภาวะซีด เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หรือ อาการบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ) ควรปรึกษาแพทย์ทันที แพทย์จะ
- 140 พิจารณาว่าควรติดตามอาการท่านอย่างใกล้ชิดหรือเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นในการรักษาแทน
- 141 **รายการอาการไม่พึงประสงค์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น**
- 142 พบบ่อย (อาจเกิดในผู้ป่วย 1 ใน 10 คน)
- 143 - ปวดท้อง
- 144 - ผลการตรวจเลือดของตับผิดปกติ
- 145 - เลือดออกที่ผิวหนังหรือใต้ผิวหนัง
- 146 - โลหิตจาง (ระดับเซลล์เม็ดเลือดแดงต่ำ)
- 147 - เลือดออกที่จมูก
- 148 - เลือดออกที่ช่องคลอด
- 149 - ผื่น
- 150 - เลือดออกในลำไส้
- 151 - เลือดออกที่ปาก และ/หรือ คอ
- 152 - มีเลือดในปัสสาวะ
- 153 - เลือดออกเนื่องจากอาการบาดเจ็บ
- 154 - เลือดออกในกระเพาะอาหาร
- 155 - เวียนหัว
- 156 - รู้สึกไม่สบาย

- 157 - ปวดหัว
- 158 - อากาการคัน
- 159 พบไม่บ่อย (อาจเกิดในผู้ป่วย 1 ใน 100 คน)
- 160 - เลือดออกชนิดต่างๆ
- 161 - เลือดออกในตา
- 162 - เลือดออกจากแผลผ่าตัดภายหลังการผ่าตัด
- 163 - มีเลือดในน้ำลายเมื่อไอ
- 164 - เลือดออกที่สมอง
- 165 - จำนวนเกล็ดเลือดลดลง (ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันตัวของเลือด)
- 166 - ปฏิกริยาภูมิแพ้
- 167 - ลมพิษ
- 168 พบน้อย (อาจเกิดในผู้ป่วย 1 ใน 1,000 คน)
- 169 - เลือดออกในกล้ามเนื้อ
- 170 - เลือดออกในข้อ
- 171 - เลือดออกในช่องท้อง
- 172 - เลือดออกในหัวใจ
- 173 - เลือดออกด้านในกระโหลกศีรษะ
- 174 - เลือดออกเนื่องจากขั้นตอนการผ่าตัด

175 5. ควรเก็บลึกเขียนอย่างไร

- 176 เก็บยาให้พ้นสายตาและมือเด็ก
- 177 ห้ามใช้ยาหลังวันสิ้นอายุที่แสดงอยู่บนกล่องและแผงยา วันสิ้นอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือน
- 178 ผลิตภัณฑ์ยาไม่ต้องการการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
- 179 ไม่ควรทิ้งยาผ่านทางท่อน้ำทิ้งหรือขยะของครัวเรือน สอบถามเภสัชกรว่าจะทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างไร มาตรการนี้จะ
- 180 ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

181 6. ข้อมูลเพิ่มเติม

- 182 ส่วนประกอบของลึกเขียนา
- 183 - สารออกฤทธิ์ คือ อีดีออกซาแบน ในรูปเกลือ tosilate
- 184 *ลึกเขียนา 15 มก.*: แต่ละเม็ดบรรจุยาอีดีออกซาแบนในรูปเกลือ tosilate ความแรง 15 มก.
- 185 *ลึกเขียนา 30 มก.*: แต่ละเม็ดบรรจุยาอีดีออกซาแบนในรูปเกลือ tosilate ความแรง 30 มก.
- 186 *ลึกเขียนา 60 มก.*: แต่ละเม็ดบรรจุยาอีดีออกซาแบนในรูปเกลือ tosilate ความแรง 60 มก.
- 187 - ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่

- 188 *ลิกเซีย 15 มก.*: ส่วนประกอบของเม็ดยา: mannitol (E421), pregelatinised starch, crospovidone,
 189 hydroxypropylcellulose, magnesium stearate (E470b)
 190 *ลิกเซีย 30 มก.*: ส่วนประกอบของเม็ดยา: mannitol (E421), pregelatinised starch, crospovidone,
 191 hydroxypropylcellulose, magnesium stearate (E470b)
 192 *ลิกเซีย 60 มก.*: ส่วนประกอบของเม็ดยา: mannitol (E421), pregelatinised starch, crospovidone,
 193 hydroxypropylcellulose, magnesium stearate (E470b)
 194 - ส่วนประกอบของฟิล์มเคลือบ:
 195 *ลิกเซีย 15 มก.*: hypromellose (E464), macrogol 8000, titanium dioxide (E171), talc, carnauba
 196 wax, iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E172)
 197 *ลิกเซีย 30 มก.*: hypromellose (E464), macrogol 8000, titanium dioxide (E171), talc, carnauba
 198 wax, iron oxide red (E172)
 199 *ลิกเซีย 60 มก.*: hypromellose (E464), macrogol 8000, titanium dioxide (E171), talc, carnauba
 200 wax, iron oxide yellow (E172)

201 ลิกเซียมีลักษณะเป็นอย่างไรและบรรจุอยู่ในภาชนะแบบไหน

- 202 ยาเม็ดเคลือบฟิล์มลิกเซีย ขนาด 15 มก. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีส้ม รูปกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.7 มม.) ด้านหนึ่ง
 203 มีสัญลักษณ์ “DSC L15” บรรจุอยู่ในแผงบลิสเตอร์ แผงละ 14 เม็ด และบรรจุในกล่องกระดาษละ 1 แผง
 204 ยาเม็ดเคลือบฟิล์มลิกเซีย ขนาด 30 มก. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพู รูปกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 มม.) ด้าน
 205 หนึ่งมีสัญลักษณ์ “DSC L30” บรรจุอยู่ในแผงบลิสเตอร์ แผงละ 14 เม็ด และบรรจุในกล่องกระดาษละ 2 แผง
 206 ยาเม็ดเคลือบฟิล์มลิกเซีย ขนาด 60 มก. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลือง รูปกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 มม.) ด้าน
 207 หนึ่งมีสัญลักษณ์ “DSC L60” บรรจุอยู่ในแผงบลิสเตอร์ แผงละ 14 เม็ด และบรรจุในกล่องกระดาษละ 2 แผง

208 **ผลิตโดย**

- 209 Daiichi Sankyo Europe GmbH
 210 Luitpoldstrasse 1
 211 85276 Pfaffenhofen
 212 Germany

213 **ชื่อผู้รับอนุญาตนำส่งยาและผู้จัดจำหน่าย**

- 214 บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด
 215 ชั้น 24 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 216 โทร. 0 2631 2070-9 โทรสาร 0 2236 2656

217 **ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ**

- 218 บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด
 219 ชั้น 24 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

220 โทร. 0 2631 2070-9 โทรสาร 0 2236 2656

221 วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร

222 10/2561