

มีฟิพริสโตน 200 มิลลิกรัม และ
ไมโซพรอสตอล 200 ไมโครกรัม
ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า MISOMIFE-FEM COMBO (ไมโซไมเฟ-เฟม คอมโบ)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยา คือ มีฟิพริสโตน (mifepristone) 1 เม็ด และไมโซพรอสตอล (misoprostol) 4 เม็ด
- 1.2 ยานี้ใช้ทำอะไร
ยานี้ใช้สำหรับยุติการตั้งครรภ์

2. ข้อควรระวังในยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
x เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยาในกลุ่มพรอสตาแกลนดิน
- x เป็นโรคต่อมหมวกไตวาย
- x เป็นโรคหอบหืดรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา
- x เป็นโรคติดเชื้อ หรือพยาธิที่ร้าย
- x แพทย์ยังไม่ยืนยันว่ากำลังตั้งครรภ์
- x ตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์นอกมดลูก
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
• ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- เป็นโรคหัวใจหรือแพทย์แจ้งว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
- มีเลือดออกผิดปกติ หรือเป็นโรคเลือดออกง่าย หรือเป็นโรคโลหิตจาง
- เป็นโรคตับหรือไต
- มีภาวะขาดสารอาหาร
- เคยใช้ยาแล้วมีภาวะอัมพาตที่ใบหน้า
- มีการตัดหรือขลิบอวัยวะเพศ
- กำลังใช้ยาฮอร์โมนหรือยารักษาฮอร์โมน
- หากใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด จะต้องเอาออกก่อนการรักษา
• ต้องตรวจหาเลือดออกก่อนใช้ยานี้
• แจ้งแพทย์ หากกำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้
• ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับอายุครรภ์
- แพทย์จะแจ้งวิธีใช้ยา โดยกินยา เห็นยาที่ช่องคลอดออกมาได้สิ้น หรืออมข้างกระพุ้งแก้ม ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
- อย่าดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับยานี้
- 3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร
• ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้
- ให้ปรึกษาแพทย์ หากเปลี่ยนใจว่าจะตั้งครรภ์ต่อ
- 3.3 ถ้าใช้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
• หากทานใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยาจนครบตามที่แพทย์สั่ง
- ยานี้อาจทำให้ปวดหัวและเวียนหัว หากมีอาการ ควรหลีกเลี่ยงการขับชี่ ยานอนหลับหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกที่สูง ต้องคุมกำเนิดภายใน 9 วัน นับตั้งแต่เริ่มใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที
• ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดท้องรุนแรง
- เลือดไหลจากช่องคลอดไม่หยุด
- มีไข้ต่อเนื่องนานกว่าสี่ชั่วโมง หรือตกขามักสิ้นไม่พึงประสงค์
- กินยาแก้ปวดแล้วไม่หายปวด
- "หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที"

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดอาการ แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

- มดลูกหดเกร็ง
 - คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งท้อง ท้องเสีย
 - ปวดหัว เวียนหัว มีอาการอื่น
- "ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์
พยาบาล หรือเภสัชกร"

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา
- ยาเม็ดมีฟิพริสโตน เป็นเม็ดรูปกลม สีเหลือง
- ยานี้ไม่มีฟิพริสโตน เป็นเม็ดรูปกลม สีเหลือง
- ส่วนประกอบอื่น ๆ
- ยาเม็ดมีฟิพริสโตน มีส่วนประกอบอื่น ได้แก่
- คอลลอยด์ซิลิโคนไดออกไซด์, แป้งข้าวโพด,
- โพวิโดน, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไมโครคริสทัลไลน์
- เซลลูโลส
- ยาเม็ดไมโซพรอสตอล มีส่วนประกอบอื่น ได้แก่
- ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส, โซเดียมสเตียเรตซีไกล
- โคลท, นามิโนลเฟง, ไฮโปรมลโลส

ผู้ผลิต

China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd.
ประเทศไทย

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ดีอาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
เลขที่ 28 ชั้น 4 ยุติธรรม อาคารซีทาว งามวงศ์วาน 6
ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
เอกสารถูกปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2565

- **ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร