

## ในคาร์ดิป็น

ความแรง 10 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตร  
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด  
ชื่อการค้า Holdipine (โฮลด์ดิป็น)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ในคาร์ดิป็นไฮโดรคลอไรด์ มีตัวยา 10 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตร

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่รุนแรงมาก และใช้ควบคุมความดันโลหิตสูงหลังจากการผ่าตัด

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีอาการปวดเค้นหัวใจ
- ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากการตีบของลิ้นหัวใจหรือความบกพร่องของหัวใจ
- มีอาการหัวใจขาดเลือดในช่วงแปดวันหลังสุด
- ได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าแพ้น้ำตาลฟรุกโทส

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเจ็บหน้าอก
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคตับ ความดันสูงในสมอง หรือโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเร็วๆ นี้
- แจ้งแพทย์หากกำลังใช้ยาหรืออาหารเสริมดังต่อไปนี้  
• ซีกโคลสปอริน • ดีจ็อกซิน • เฟินทานิล • ลาโคซาไมด์  
• สารสกัดเซนต์จอห์นส์เวิร์ต • ทาโครลิมีส • กลุ่มเบต้าบล็อคเกอร์
- แจ้งแพทย์หากอายุต่ำกว่า 18 ปี
- แจ้งแพทย์หากเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 3 หรือลูกแฝด หรือให้นมบุตร

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้ด้วยวิธีหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ โดยขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก มือ ข้อเท้า ขา
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวน้ำหรือเลือดออกผิปกัด
- บัสสาวะหรือไอเป็นเลือด
- บัสสาวะปริมาณมากขึ้นหรือบ่อยขึ้น
- หัวใจเต้นเร็วหรือไม่สม่ำเสมอ
- แขน ขา ขาหรืออ่อนแรง หรือเจ็บน่อง

“หากมีอาการเหล่านี้  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

### 5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกรหรือพยาบาล

- อาการปวดหรือเวียนศีรษะ ใจสั่น มึน
  - ขาหรือข้อเท้าบวม
  - คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกไม่สบาย ผิวหนังแดง
- “ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน ในขวดแก้วสีชา
- มีตัวยาสำคัญ ในคาร์ดิป็นไฮโดรคลอไรด์ 10 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตร
- มีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ซอร์บิทอล, กรดซิตริก, น้ำ, โซเดียมไฮดรอกไซด์

ผู้ผลิต: บริษัท นานกวง ฟาร์มาซูติคอล จำกัด  
ประเทศไทย

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

