

อิมาทินิบ

ความแรง 100 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Ivic (ไอวิค)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อิมาทินิบ เมซิลเลท (Imatinib mesilate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด, มะเร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งผิวหนัง ซึ่งแพทย์ต้องตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้หากเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากเป็นผู้มีหรือเคยมีปัญหาที่ตับ ไต หรือหัวใจ
- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกและกำลังรับยา ลีโวไทรอกซิน (Levothyroxine)
- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากมีหรือเคยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เพราะอาจทำให้โรคตับอักเสบบีกำเริบซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
- แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากท่านใช้ยาอื่นๆ อาหารเสริมหรือสมุนไพร เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของยานี้

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร อย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค จึงควรกินยาตามแพทย์สั่ง
- กินยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันทีแล้วดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะและลำไส้
- หากกลืนยาไม่ได้ ให้ละลายเม็ดยาในน้ำเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ล และดื่มให้หมดทันที
- หากกลืนยาไม่ได้ ให้ละลายเม็ดยาในน้ำเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ล และดื่มให้หมดทันที

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาแล้วนึกออกภายใน 6 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยาเกิน 6 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยามื้อนั้น ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ท้องเสียรุนแรง ปวดท้องรุนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที และนำยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและทาครีมกันแดดที่มีสาร SPF เพราะยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้วังงเวียน ตาพร่ามัว

คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ
- อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น เหนื่อยขณะออกกำลังกายหรือขณะนอนราบ หัวใจเต้นเร็ว ตัวบวม
- เลือดออกในทางเดินอาหาร ดูได้จากมีอาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- ปวดกล้ามเนื้อ ตะคริว เป็นผื่นแดง
- บวม น้ำหนักขึ้น

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ไอวิคเป็นเม็ดรูปไข่สีน้ำตาล มีรอยบากด้านหนึ่ง และมีตัวอักษร “IMA” สลักอีกด้าน
- ตัวยาสําคัญ อิมาทินิบ มีไซเลท
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ Microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลลิน เซลลูโลส) Crospovidone (ครอสโพรวิดอน) Copovidone (โคโพรวิดอน) Colloidal silicon dioxide (คอลลอยด์ซิลิคอน ไดออกไซด์) Magnesium stearate (แมกนีเซียม สเตียเรต) Opadry (โอปาดราย) Purified water (น้ำบริสุทธิ์)

ผู้ผลิต TTY Biopharm Company Limited Liudu Factory
No. 5, Gongjian W. Rd., Qidu District, Keelung,
Taiwan, R.O.C

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไตวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด

เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2564

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>