

## เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

คำแนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย

อินโวคานา® (อิน-โว-คา-นา)

(คานากลิฟลอสิน (INN: Canagliflozin))

รูปแบบเม็ด

ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับอินโวคานาคืออะไร?

อินโวคานาสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่สำคัญ ประกอบด้วย:

- การตัดอวัยวะออก (Amputation) อินโวคานาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตัดบางส่วนของขาและเท้าออก ซึ่งส่วนใหญ่รวมถึงการตัดนิ้วเท้าหรือส่วนของเท้า อย่างไรก็ตาม เคยมีรายงานการตัดบางส่วนของขา ซึ่งรวมถึงบริเวณขา (Leg) ช่วงล่างและช่วงบนของหัวเข่า ผู้ป่วยบางรายมีการตัดอวัยวะออกมากกว่า 1 ครั้ง และบางรายมีการตัดอวัยวะออกทั้งสองด้านของร่างกาย

คุณอาจมีความเสี่ยงต่อการตัดขาที่สูงขึ้น ถ้าท่าน:

- มีประวัติเคยได้รับการผ่าตัดบางส่วนของอวัยวะออก (Amputation)
- เป็นโรคหัวใจ หรือมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
- เคยมีการอุดตันของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดตีบที่ขา
- มีความเสียหายของเส้นประสาท (โรคเส้นประสาท) ที่ขา
- เคยมีแผลเปื่อยที่เท้าหรือมีอาการเจ็บที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน

ควรรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดหรือมีอาการกดเจ็บ อาการเจ็บ มีแผลเปื่อย หรือติดเชื้อที่ขาหรือเท้า แพทย์อาจตัดสินใจหยุดอินโวคานาเป็นเวลาสักระยะถ้าท่านมีอาการหรืออาการแสดงเหล่านี้ ปรีกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลเท้าที่เหมาะสม

- ภาวะขาดน้ำ อินโวคานาสามารถส่งผลให้บางคนมีภาวะขาดน้ำ (สูญเสียน้ำในร่างกายปริมาณมากเกินไป) ภาวะขาดน้ำอาจส่งผลให้ท่านรู้สึกเวียนศีรษะ หมดสติ หน้ามืดเป็นลม หรืออ่อนแรง โดยเฉพาะเมื่อท่านลุกขึ้นยืน (ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า)

ท่านอาจมีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีภาวะขาดน้ำถ้าท่าน:

- มีความดันโลหิตต่ำ
- ใช้ยาลดความดันโลหิต รวมทั้งยาขับปัสสาวะ (ยาขับน้ำ)
- กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมอาหารให้มีโซเดียม (เกลือ) ต่ำ
- มีปัญหาทางไต
- อายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสามารถทำได้เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ รวมถึงปริมาณน้ำที่ท่านควรดื่มในแต่ละวัน

- **ติดเชื้อราในช่องคลอด** สตรีที่ใช้อินโวคานาอาจเกิดการติดเชื้อราในช่องคลอดได้ อาการของการติดเชื้อราในช่องคลอดประกอบด้วย:
  - ช่องคลอดมีกลิ่น
  - ตกขาวมีสีขาวหรือสีออกเหลือง (ตกขาวอาจมีลักษณะเป็นก้อนหรือคล้ายคottage cheese (Cottage cheese))
  - คันบริเวณช่องคลอด
- **ติดเชื้อราบริเวณองคชาติ (ส่วนหัวองคชาติอักเสบ (balanitis) หรือส่วนหัวองคชาติและหนังหุ้มปลายองคชาติอักเสบ (balanoposthitis))** ผู้ชายที่ใช้อินโวคานาอาจเกิดการติดเชื้อราที่ผิวหนังบริเวณองคชาติได้ ผู้ชายบางรายที่ไม่ได้ทำการขลิบอวัยวะเพศ อาจเกิดการบวมขององคชาติซึ่งทำให้การดึงกลับของหนังหุ้มปลายองคชาติทำได้ยาก อาการอื่นของการติดเชื้อราบริเวณองคชาติประกอบด้วย:
 

○ แดง คัน หรือบวมบริเวณองคชาติ	○ มีผื่นผิวหนังบริเวณองคชาติ
○ มีสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นเหม็นออกจากองคชาติ	○ เจ็บปวดที่ผิวหนังรอบ ๆ องคชาติ

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติถ้าท่านมีอาการของการติดเชื้อราในช่องคลอดหรือบริเวณองคชาติ แพทย์อาจแนะนำท่านให้ใช้ยาต้านเชื้อรา ควรรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีหากท่านใช้ยาต้านเชื้อราแล้วและอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้น

### อินโวคานาคืออะไร?

- อินโวนาคานาเป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ ใช้สำหรับ:
  - ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  - ใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการที่สำคัญของหลอดเลือดหัวใจ เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดอุดตัน (สโตรก) หรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเดิมเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อนแล้ว
- ห้ามใช้อินโวนาคานาในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
- ห้ามใช้อินโวนาคานาในผู้ที่มีภาวะไตแอบิติกคิโทแอซิดอซิซิส (diabetic ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มขึ้น)
- ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้อินโวนาคานาในเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

### ใครไม่ควรใช้อินโวนาคานา?

#### ห้ามใช้อินโวนาคานา ถ้าท่าน:

- แพ้ยาคานากลิฟลอสซินหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในอินโวนาคานา (โปรดดูส่วนประกอบของอินโวนาคานาที่ส่วนท้ายของคำแนะนำการใช้ยาฉบับนี้) อาการของปฏิกิริยาแพ้อินโวนาคานาอาจประกอบด้วย:
  - ผื่นผิวหนัง
  - เกิดรอยบวมแดงและนูนบนผิวหนัง (ลมพิษ)
  - มีอาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้น และลำคอ ซึ่งส่งผลทำให้หายใจหรือกลืนลำบาก
- มีปัญหาทางไตขั้นรุนแรง หรือกำลังได้รับการล้างไต

### ควรแจ้งอะไรกับแพทย์ก่อนใช้อินโวนาคานา?

#### ก่อนท่านใช้อินโวนาคานา แจ้งแพทย์หากท่าน:

- มีประวัติเคยได้รับการผ่าตัดอวัยวะออก (Amputation)
- เป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
- เคยมีการอุดตันของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดตีบที่ขา

- มีความเสียหายของเส้นประสาท (โรคเส้นประสาท) ที่ขา
- เคยมีแผลเปื่อยที่เท้าหรือมีอาการเจ็บที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน
- มีปัญหาทางไต
- มีปัญหาทางตับ
- มีประวัติการติดเชื้อมบริเวณทางเดินปัสสาวะ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
- กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมอาหารให้มีโซเดียม (เกลือ) ต่ำ ซึ่งแพทย์อาจพิจารณาเปลี่ยนการควบคุมอาหาร หรือขนาดยาอินโวคานา
- กำลังจะได้รับการผ่าตัด
- รับประทานอาหารได้น้อยลง เนื่องจากเจ็บป่วย ผ่าตัด หรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมอาหาร
- มีหรือเคยมีปัญหากับตับอ่อน รวมถึงตับอ่อนอักเสบ หรือได้รับการผ่าตัดตับอ่อน
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมาก หรือดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ (การดื่มแบบยกหมดแก้ว (“binge” drinking))
- เคยเกิดปฏิกิริยาการแพ้อินโวคานา
- มีภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
- กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ อินโวคานาอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ถ้าท่านมีการตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำลังใช้อินโวคานา ให้รีบแจ้งแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางที่ดีที่สุดในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของท่านในระหว่างที่ท่านกำลังตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร หรือวางแผนจะให้นมบุตร อินโวคานาอาจผ่านสู่น้ำนมได้ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกของท่าน ปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางที่ดีที่สุดที่จะให้อาหารทารกของท่าน ห้ามให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้อินโวคานา

**แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทุกตัวที่ท่านกำลังใช้อยู่ รวมถึงยาที่แพทย์สั่ง และยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร**

อินโวคานาอาจส่งผลต่อการทำงานของยาตัวอื่น และยาตัวอื่นอาจส่งผลต่อการทำงานของอินโวคานา โปรดแจ้งแพทย์ถ้าท่านกำลังใช้:

- ยาขับปัสสาวะ (ยาขับน้ำ)
- ไรแฟมพิน (ใช้ในการรักษาหรือป้องกันวัณโรค)

- ฟินิโตอิน หรือฟิโนบาร์บิทัล (ใช้ในการควบคุมอาการชัก)
- ไรโทนาเวียร์ (ใช้ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี)
- ดิจ็อกซิน (ใช้ในการรักษาโรคหัวใจ)

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับรายการยาเหล่านี้ ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายานของท่านอยู่ในรายการดังกล่าวหรือไม่

ท่านควรทราบว่าท่านกำลังใช้ยาตัวใดอยู่ โปรดเก็บรายการยาไว้ และแสดงให้แพทย์หรือเภสัชกรดูเมื่อท่านได้รับยาตัวใหม่

### ควรใช้อินโวนานาอย่างไร?

- รับประทานอินโวนานาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งแพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาของท่านตามความจำเป็น
- แนะนำให้รับประทานอินโวนานาก่อนอาหารเช้าของวัน
- แพทย์อาจแจ้งท่านให้รับประทานอินโวนานาร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานตัวอื่น ซึ่งภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำอาจเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นเมื่อใช้อินโวนานาร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานบางชนิด  
โปรดศึกษาหัวข้อ “อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินโวนานามีอะไรบ้าง?”
- ถ้าท่านลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ หากเป็นเวลาใกล้จะถึงมื้อยาถัดไป ให้ท่านข้ามมื้อที่ลืมและรับประทานยามื้อถัดไปตามเวลาและขนาดปกติ ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็น 2 เท่า  
ปรึกษาแพทย์ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลืมรับประทานยา
- ถ้าท่านรับประทานอินโวนานาในขนาดที่มากเกินไป ให้รีบแจ้งแพทย์หรือไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที
- เมื่อร่างกายของท่านอยู่ในภาวะเครียด เช่น มีไข้ ได้รับบาดเจ็บ (เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์) ติดเชื้อหรือผ่าตัด ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าท่านมีภาวะเหล่านี้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากอาจต้องมีการปรับปริมาณยารักษาโรคเบาหวานที่ท่านใช้อยู่
- ให้ออกกำลังกาย ออกกำลังกายตามที่แพทย์สั่งในระหว่างที่กำลังใช้อินโวนานา
- ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดตามที่แพทย์สั่ง
- อินโวนานาอาจส่งผลให้ตรวจพบปริมาณน้ำตาล (กลูโคส) ในปัสสาวะของท่าน (มีค่าบวก)

- แพทย์อาจทำการตรวจเลือดก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้อินโวกานาและตรวจเลือดระหว่างการรักษาหากมีความจำเป็น แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาอินโวกานาโดยขึ้นกับผลจากการตรวจเลือดของท่าน
- แพทย์จะตรวจเบาหวานโดยการตรวจเลือดด้วยวิธีปกติ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และการตรวจค่าฮีโมโกลบิน A<sub>1c</sub>

### อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินโวกานามีอะไรบ้าง?

อินโวกานาอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ประกอบด้วย:

ดูหัวข้อ “ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับอินโวกานาคืออะไร?”

- **ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้น)** มีรายงานการเกิดภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) ในผู้ที่เป็โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 ในระหว่างการรักษาด้วยอินโวกานา ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) เป็นภาวะที่รุนแรงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) สามารถเกิดขึ้นร่วมกับการใช้อินโวกานาแม้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดของท่านต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให้ท่านหยุดใช้อินโวกานาและรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าท่านมีอาการดังต่อไปนี้:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <input type="radio"/> คลื่นไส้                | <input type="radio"/> เหนื่อย    |
| <input type="radio"/> อาเจียน                 | <input type="radio"/> หายใจลำบาก |
| <input type="radio"/> ปวดบริเวณกระเพาะ (ท้อง) |                                  |

ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ระหว่างที่กำลังใช้อินโวกานา ถ้าเป็นไปได้ให้ตรวจสอบระดับคีโตนในปัสสาวะของท่าน แม้วาระดับน้ำตาลในเลือดของท่านจะต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

- **ปัญหาทางไต** มีรายงานการเกิดไตวายเฉียบพลันในผู้ที่ใช้อินโวกานา ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าท่าน:
  - รับประทานอาหารปริมาณลดลง หรือดื่มเครื่องดื่มลดลง ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านป่วย หรือไม่ สามารถรับประทานอาหารได้ หรือ
  - ท่านเริ่มมีอาการสูญเสียของเหลวจากร่างกาย เช่น อาเจียน ท้องเสีย หรืออยู่กลางแจ้งแดดนานเกินไป

- การติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะขั้นรุนแรง เคยมีรายงานการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะขั้นรุนแรงที่สามารถนำไปสู่การรักษาตัวในโรงพยาบาลในผู้ที่ได้รับอินโวคานา ให้แจ้งแพทย์ถ้าท่านมีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะ เช่น รู้สึกแสบร้อนในขณะที่กำลังปัสสาวะ ต้องการถ่ายปัสสาวะบ่อย ต้องการถ่ายปัสสาวะทันทีทันใด ปวดบริเวณช่วงล่างของท้อง (บริเวณเชิงกราน) หรือปัสสาวะมีเลือดปน ในผู้ป่วยบางรายอาจมีไข้ ปวดหลัง คลื่นไส้ หรืออาเจียน
- ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ) ถ้าท่านใช้อินโวคานาร่วมกับยาตัวอื่นที่สามารถส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้ เช่น ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย หรืออินซูลิน ท่านมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจจำเป็นที่จะต้องลดขนาดยาของยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย หรืออินซูลิน ในระหว่างที่ท่านใช้อินโวคานา อาการและอาการแสดงของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจประกอบด้วย:

- ปวดศีรษะ      ○ ง่วงซึม      ○      ○ อ่อนแรง      ○ สับสน      ○ เวียนศีรษะ
- หงุดหงิด      ○ รู้สึกหิว      ○      ○ หัวใจเต้นเร็ว      ○ เหนื่อย      ○ สั่น หรือ รู้สึกกระวนกระวาย

ออก

- การติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ซึ่งมีผลทำลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (โรคเนื้อเน่า (necrotizing fasciitis)) ในบริเวณระหว่างทวารหนักกับอวัยวะเพศ และ รอบทวารหนัก (perineum)

โรคเนื้อเน่าบริเวณระหว่างทวารหนักกับอวัยวะเพศและรอบทวารหนัก (necrotizing fasciitis) เกิดในผู้หญิงและผู้ชายที่ใช้อินโวคานา โรคดังกล่าวอาจทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาจต้องผ่าตัดหลายครั้ง และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ แจ้งแพทย์ทันทีหากท่านมีไข้ หรือรู้สึกอ่อนเพลียมาก เหนื่อยหรือรู้สึกไม่สบาย (malaise) และมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ในบริเวณระหว่างทวารหนักกับอวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก

- ปวดหรือตึง      ○ บวม      ○ ผิวหนังแดง (erythema)

- ปฏิบัติการแพทย์ขั้นรุนแรง ถ้าท่านมีอาการแพ้ขั้นรุนแรง ให้หยุดใช้อินโวคานาและรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีหรือไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที ดูหัวข้อ “ใครไม่ควรใช้อินโวคานา?” แพทย์อาจให้ยาท่านสำหรับควบคุมอาการแพ้และส่งจ่ายยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานตัวอื่น

- **กระดูกหัก (แตก)** มีรายงานการเกิดกระดูกหักหรือกระดูกแตก ในผู้ที่ใช้อินโวคานา ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักหรือกระดูกแตก

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของอินโวคานา ประกอบด้วย:

- ติดเชื้อราในช่องคลอด หรือติดเชื้อราบริเวณองคชาติ (ดูหัวข้อ “**ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับอินโวคานาคืออะไร?**”)
- มีการเปลี่ยนแปลงในการปัสสาวะ เช่นมีความต้องการปัสสาวะอย่างฉับพลันบ่อยมากกว่าปกติ ปัสสาวะในปริมาณมาก หรือปัสสาวะในเวลากลางคืน

แจ้งแพทย์ถ้าท่านมีอาการข้างเคียงที่รบกวนการใช้ชีวิตหรืออาการไม่หายไปเอง อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินโวคานาทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ให้สอบถามแพทย์เพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการข้างเคียง ท่านสามารถรายงานอาการข้างเคียงต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือบริษัท แจนเซน-ซีลแลก จำกัดได้

**ควรเก็บรักษาอินโวคานาอย่างไร?**

- ห้ามเก็บอินโวคานาที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ตรวจสอบวันหมดอายุบนกล่องยาด้านนอก
- เก็บอินโวคานาและยาทุกชนิดให้พ้นจากมือเด็ก

**ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อินโวคานาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล**

ห้ามใช้อินโวคานาสำหรับภาวะที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่าย และห้ามให้อินโวคานาแก่ผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะมีอาการเดียวกับท่าน เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาได้

คำแนะนำการใช้ยาฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับอินโวคานา ท่านสามารถสอบถามเภสัชกรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินโวคานาที่มีระบุในเอกสารกำกับยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินโวคานา โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  
ได้ที่เว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

## ส่วนประกอบของอินโวคานามีอะไรบ้าง?

ตัวยาสำคัญ: คานากลิฟลอสซิน

สารประกอบที่ไม่มีฤทธิ์: คออสคาร์เมลโลสโซเดียม ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส แลคโตสแอนไฮดรัส แมกนีเซียมสเตียเรต และไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส นอกจากนี้ ส่วนเคลือบเม็ดยาประกอบด้วยไฮรอนออกไซด์เฮลโลว์ (ยาเม็ดขนาด 100 มิลลิกรัม เท่านั้น) แมโครกอล/โพลีเอธิลีนไกลคอล (พีอีจี) โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ทัลค์ และไทเทเนียมไดออกไซด์

**ลักษณะและส่วนประกอบของภาชนะบรรจุ:** ยาเม็ดบรรจุแยกเม็ดในแผงบลิสเตอร์ที่ผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)/อะลูมิเนียมฟอยล์ จำนวน 10 เม็ดต่อ 1 แผงบลิสเตอร์ ในกล่องยาจะมีการบรรจุดังนี้: 10 เม็ด (1 แผงบลิสเตอร์) 30 เม็ด (3 แผงบลิสเตอร์) 90 เม็ด (9 แผงบลิสเตอร์) และ 100 เม็ด (10 แผงบลิสเตอร์)

## คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
- ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยที่มีภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
- สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้นี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้นี้
- ไม่ควรใช้นี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง หิวน้ำผืดปกติ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก สับสน แม้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่มาก ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเนื่องจากอาจเกิดอาการ diabetic ketoacidosis
- ควรระมัดระวังการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่อวัยวะเพศ และระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใช้นี้

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตโดย	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
อินโวคานา 100 มิลลิกรัม	Janssen Ortho, LLC Gurabo ประเทศเปอร์โตริโก	1C 36/58 (NC)	7 เมษายน 2558
อินโวคานา 300 มิลลิกรัม	Janssen Ortho, LLC Gurabo ประเทศเปอร์โตริโก	1C 37/58 (NC)	7 เมษายน 2558

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตโดย	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
อินโวคานา 100 มิลลิกรัม	Janssen Cilag S.p.A. Latina ประเทศอิตาลี	1C 15024/61 (NC)	17 เมษายน 2561
อินโวคานา 300 มิลลิกรัม	Janssen Cilag S.p.A. Latina ประเทศอิตาลี	1C 15025/61 (NC)	17 เมษายน 2561

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด ตุลาคม 2561

ได้รับลิขสิทธิ์จาก **Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation**

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์: 02-792-7200

โทรสาร: 02-792-7222