

อะซิโทรมัยซิน

ความแรง 200 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน
ชื่อการค้า AZITO DRY SYRUP
(อะซิโท ทราย ไซร็ป)

1. ยานี้คืออะไร**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้ชื่อว่า อะซิโทรมัยซิน ไดไฮเดรต (Azithromycin dihydrate) มีตัวยา 200 มิลลิกรัม เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มแมโครไลด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยา เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ โพรงอากาศอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียในหู ฝีหนอง หรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาฆ่าเชื้อกลุ่มแมโครไลด์ เช่น อีริโทรมัยซิน คลาร์โทรมัยซิน เป็นต้น

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- ท่านเป็นโรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน
- ท่านมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ท่านกำลังใช้ยารักษาโรคปวดหัวไมเกรนกลุ่มเออร์ก็อตอัลคาลอยด์ เช่น เออร์โกทามีน
- ท่านใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่ เช่น
 - ยากันเลือดแข็งตัว วอร์ฟาริน
 - ยากดภูมิ ซีกโคโลสปอริน
 - ยาลดกรด
 - ยารักษาหัวใจล้มเหลว ดิจ็อกซิน
 - ยารักษาเกาต์ โคลชิซิน
 - ยาเทอร์ฟีนาดีน
- ท่านกำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้องหรือกำลังให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นเพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- วิธีการผสมยา
 - เคาะขวดยาเพื่อให้ผงยาในขวดไม่จับเป็นก้อน
 - ใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติเติมลงในขวดตามปริมาณที่กำหนด (9 มล.)
 - เขย่าให้ยาละลายเข้ากัน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง (เช่น สูญเสียการมองเห็น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียรุนแรง) ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ฝีหนองหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องเสียรุนแรงหรือนาน อาจมีเลือดหรือมูกปน
- หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
- ความดันต่ำ
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องอืด
- คลื่นไส้ ท้องเสีย ไม่อยากอาหาร
- มีนหัว การมองเห็นผิดปกติ
- ชาตามร่างกาย
- ปวดข้อ
- เหนื่อยเพลีย

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ยานี้มีอายุ 10 วัน หลังจากผสมยา (อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส)
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา:** ผงสีขาว เมื่อผสมน้ำแล้วได้ยาน้ำแขวนตะกอนสีขาวขุ่น กลิ่นกล้วยหอม
- ตัวยาสำคัญ:** อะซิโทรมัยซิน ไดไฮเดรต (Azithromycin dihydrate)
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ซูโครส ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส แซนแทนกัม ไตรเบสิกโซเดียมฟอสเฟส แอนไฮดรัส เซอร์ริฟาวเดอร์ บานานาฟาวเดอร์ วนิลาฟาวเดอร์

ผู้ผลิต หสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 79 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร