

เอदारาโวน

ความแรง 30 มิลลิกรัมต่อ 20 มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า RADICAVA™ (ราดิคาวา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเอदारาโวน (Edaravone) มีตัวยา 30 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มที่ใช้ในโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ชะลอความรุนแรงของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ (ยานี้มีซัลไฟท์เป็นส่วนประกอบ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ซัลไฟท์)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ป่วยสูงอายุ เพราะอาจมีความไวในการตอบสนองต่อยามากกว่าคนหนุ่มสาว
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคหอบหืด
 - กำลังตั้งท้องหรือให้นมบุตร
 - กำลังใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ เซฟฟาโซลิน, เซฟโปเซียม, ปีเปอราซิลลิน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้จะฉีดเข้าสู่เส้นเลือดดำอย่างช้าๆโดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- งดให้นมบุตร เพราะอาจมีผลต่อทารกได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เลือดกำเดาไหลร่วมกับเลือดออกที่เหงือก มีจ้ำม่วงตามตัว ปัสสาวะสีเข้ม ตาเหลือง ตัวเหลือง หายใจถี่
- ปวดกล้ามเนื้อไม่ทราบสาเหตุร่วมกับมือเท้าชา มือเท้าแข็ง ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง
- หายใจลำบากร่วมกับ ไข้ ไอ หอบ เสมหะมาก

“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดอาการ แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกรหรือ พยาบาล

- ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดยา

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ของเหลวใสไม่มีสี
- ตัวยาสำคัญ เอदारาโวน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Sodium bisulfite (โซเดียมไบซัลไฟท์), L-Cysteine hydrochloride hydrate (แอล-ซิสเทอีนไฮโดรคลอไรด์ไฮเดรต), Sodium chloride (โซเดียมคลอไรด์), Sodium hydroxide (โซเดียมไฮดรอกไซด์), Phosphoric acid (กรดฟอสฟอริก), Water for injection (น้ำสำหรับฉีด)

ผู้ผลิต นิโปร ฟาร์มา คอร์เปอร์เรชั่น อีเสะ แพลนท์ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้นำเข้า บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**