

**บอรัทีโซมิบ****ความแรง 3.5 มิลลิกรัม****ชนิดผงละลายน้ำสำหรับฉีด****ชื่อการค้า Bortezomib PharmIdea  
(บอรัทีโซมิบ ฟาร์มไอเดีย)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า บอรัทีโซมิบ (Bortezomib) เป็นยาต้านมะเร็งที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- รักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลพิวโอไมมา
- รักษา มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแมนเทิลเซลล์

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา****2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีความผิดปกติเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- **แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้** หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
  - เป็นโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง
  - ดับทำงานผิดปกติระดับปานกลางหรือรุนแรง
  - มีอาการชา ปวดแปลบที่มือหรือเท้า
  - เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวต่ำ
  - เลือดออกง่าย เก็ดเลือดต่ำ
  - ไตทำงานผิดปกติ
  - เคยชัก
  - กำลังเป็นงูสวัด
  - กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว สับสน ตามัวตาพร่า เห็นภาพเบลอ ภาพซ้อน
  - ความจำเสื่อม การคิดมีปัญหา เดินลำบาก สูญเสียการมองเห็น **เพราะ**เป็นอาการของการติดเชื้อรุนแรงที่สมอง
  - เคยได้รับยานี้แล้วมีอาการเป็นลม เวียนหัว

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านตั้งครรภ์ มีแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของทารก
- เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี **ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะ**ยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้** เช่น
  - ยาตีโทโคนาโซล ซึ่งใช้รักษาเชื้อรา
  - ยาริโทนาเวียร์ ซึ่งใช้รักษาโรคเอดส์
  - ยาไรแฟมพิซิน ซึ่งใช้รักษาวัณโรค
  - ยารักษาโรคลมชัก
  - ยารักษาเบาหวาน

**"หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร"**

**3. วิธีใช้ยา****3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือใต้ผิวหนัง

**3.2 ถ้าหากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร**

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร หากท่านลืมมาฉีดยาหรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

**3.3 ถ้าหากฉีดยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร**

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม ตาพร่า มือเท้าเย็น เหงื่อออกมาก หายใจเร็ว เหนื่อย หรือสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดยา**

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

- ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงต้องคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาที่ใช้ยานี้ และต้องคุมกำเนิดไปนานอีกอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย
- แจ้งแพทย์ทันทีหากตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยานี้หรือตั้งครรภ์ภายใน 3 เดือนหลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย

**5. อันตรายจากยา****5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจสั้น
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ
- กล้ามเนื้อเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก
- ชัก ปวดหัว สับสน ตาพร่า ตามัว เห็นภาพเบลอ ง่วง ซึม เดินลำบาก

**"ต้องรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที"**

**5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น**

- มีอาการชา ปวดแปลบที่มือหรือเท้า
- มือ เท้า หัวเข่าหรือขาด้านล่างบวม
- หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดต่ำ เป็นลม
- ซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- ติดเชื้อง่าย มีอาการคล้ายเป็นหวัด
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
- ท้องอืด ท้องผูกหรือท้องร่วง
- แผลในปาก
- ผมร่วงหรือผมมีลักษณะผิดปกติ

**"ให้รอดูอาการ แต่ถ้าทนไม่ไหวหรือมีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์"**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส อย่าแกะออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงยาหรือก้อนยา สีขาวถึงสีขาวนวล
- **ตัวยาสำคัญ** บอริทีโซมิบ
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Mannitol (แมนนิทอล), tert-Butanol (เติร์ต-บิวทานอล), Methanol (เมทานอล), Water for injection (น้ำสำหรับยาฉีด) และ Nitrogen low oxygen (ไนโตรเจนประเภทออกซิเจนต่ำ)

**ผู้ผลิต** Limited liability company PHARMIDEA (PHARMIDEA SIA) ประเทศสวิตเซอร์

**ผู้นำเข้า** บริษัท อัสลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด

**ผู้แทนจำหน่าย** บริษัท อัสลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** 4 มิถุนายน 2564

### ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**