

เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

โมทีเลียม® (INN: Domperidone)

โมทีเลียม®-เอ็ม (INN: Domperidone Maleate)

โมทีเลียม®-เอ็ม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

โมทีเลียม® ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน



โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มใช้สำหรับรักษาโรคอะไร?

โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มใช้สำหรับรักษาอาการดังต่อไปนี้

- อาการไม่สบายท้องเนื่องจากอาหารเคลื่อนผ่านไปยังกระเพาะอาหารและลำไส้ช้า ซึ่งท่านอาจมีอาการเหล่านี้
 - รู้สึกแน่นท้องระหว่างหรือหลังรับประทานอาหารสักครู่
 - มีอาการจุกเสียด
 - อืดอืด
 - เรอมากผิดปกติ
 - ผายลม (มีลมในท้อง)
 - คลื่นไส้
 - อาเจียน
 - รู้สึกปวดแสบและ/หรือเจ็บบริเวณกระเพาะอาหาร
- ความไม่สบายท้องเนื่องจากการไหลย้อนกลับของกรดในกระเพาะอาหารมาที่หลอดอาหาร ซึ่งท่านอาจมีอาการเรอหรือแสบยอดอก (heartburn)

สำหรับการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น

- อาการคลื่นไส้และอาเจียนเนื่องจากหลายสาเหตุ (เช่น การทำเคมีบำบัด (chemotherapy) การทำรังสีบำบัด (radiotherapy) หรือจากการรักษาด้วยยาอื่น)

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับบกพร่องระยะปานกลางถึงรุนแรง
2. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีหรือเคยมีภาวะความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (QT prolongation) หรือได้รับ

- ยาอื่นที่ส่งผลให้การทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจยาวขึ้น เช่น cisapride erythromycin ketoconazole
3. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะโปแทสเซียม และแมกนีเซียมต่ำ
 4. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 เช่น ketoconazole erythromycin cimetidine omeprazole เพราะจะทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้น



เมื่อใดไม่ควรใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม

ท่านไม่ควรใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มในกรณีดังต่อไปนี้

- ท่านทราบว่าท่านแพ้ (มีภูมิไวเกิน) ต่อตัวยานี้
- ท่านเป็นโรคของต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ที่เรียกว่า prolactinoma
- ท่านมีอาการปวดเกร็งท้องอย่างรุนแรงหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีด่างอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน
- ท่านมีโรคเกี่ยวกับตับ
- ท่านกำลังได้รับยาบางชนิดที่ทำให้กระบวนการเมแทบอลิซึม (การทำลาย) ของยาชนิดอื่นๆ ในร่างกายช้าลงและยังส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจของท่าน ตัวอย่างเช่น
 - itraconazole, ketoconazole, posaconazole หรือ voriconazole ซึ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อรา
 - ยาปฏิชีวนะ เช่น erythromycin, clarithromycin หรือ telithromycin
 - ยาสำหรับโรคหัวใจ ชื่อ amiodarone
 - ยาสำหรับโรคเอดส์/โรคติดเชื้อเอชไอวี เช่น ritonavir หรือ saquinavir
 - ยาสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบบี เช่น telaprevir

หากท่านมีข้อสงสัยควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ของท่านเพื่อขอคำแนะนำ

ให้หยุดยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มและติดต่อแพทย์ของท่านทันที หากหัวใจของท่านเต้นผิดปกติ



ข้อควรระวังพิเศษในการใช้ยาคืออะไร?

ท่านควรแจ้งแพทย์ของท่านให้ทราบก่อนเริ่มใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มในกรณีดังต่อไปนี้

- ท่านมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจรวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย เจ็บหน้าอก หรือภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมถึงการเต้นของหัวใจที่เร็วหรือช้าหรือไม่ปกติ
- ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับไต

ให้หยุดยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มและติดต่อแพทย์ของท่านทันที หากหัวใจของท่านเต้นผิดปกติ

สำหรับการใช้ยาดอมเพอริโดนโดยไม่มีใบสั่งแพทย์

หากท่านมีอายุมากกว่า 60 ปี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มมีส่วนผสมของน้ำตาลแล็กโตส (lactose) และอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะต่อไปนี้

- ภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลแล็กโตส (lactose intolerance) (หมายถึงภาวะที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบได้ในน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากน้ำนม)
- ภาวะ galactosemia หรือภาวะที่การดูดซึมกลูโคส-กาแล็กโตสผิดปกติ (glucose-galactose malabsorption) (หมายถึงภาวะที่ร่างกายไม่สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลซึ่งพบได้ในอาหารหลายชนิดรวมถึงแป้ง นม และผลิตภัณฑ์จากนม)

ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานประกอบด้วยซอร์บิทอล (sorbitol) ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่แพ้ซอร์บิทอล/ ผู้ป่วยที่มีภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลฟรุคโตสที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (ไม่สามารถทนต่อฟรุคโตสได้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ในครอบครัว: ฟรุคโตส เป็นน้ำตาลที่พบได้ในผลไม้และน้ำผลไม้)

หากท่านมีอาการดังกล่าวควรแจ้งให้แพทย์ของท่านทราบก่อนเริ่มใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม



การใช้ยาในสตรีมีครรภ์

หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือคิดว่าอาจจะกำลังตั้งครรภ์ท่านควรแจ้งให้แพทย์ของท่านทราบเพื่อที่แพทย์จะได้ตัดสินใจว่าท่านสามารถใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มได้หรือไม่



การใช้ยาในสตรีระยะให้นมบุตร

โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มถูกขับออกมาในน้ำนมในปริมาณเล็กน้อย จึงไม่แนะนำให้มารดาที่กำลังใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเอง หากท่านมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ของท่าน



การใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรของท่านทราบทุกครั้งหากท่านกำลังใช้ยาชนิดใด ๆ อยู่ซึ่งรวมถึงยาที่ท่านซื้อมารับประทานเองโดยที่แพทย์ไม่ได้เป็นผู้สั่งจ่ายด้วย

ห้ามใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม หากท่านกำลังใช้ยาบางชนิดที่ทำให้กระบวนการเมแทบอลิซึม (การทำลาย) ของยาดังกล่าวในร่างกายช้าลงและยังส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจของท่าน เช่น

- itraconazole, ketoconazole, posaconazole หรือ voriconazole ซึ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อรา
- ยาปฏิชีวนะ เช่น erythromycin, clarithromycin หรือ telithromycin
- ยาสำหรับโรคหัวใจ ชื่อ amiodarone
- ยาสำหรับโรคเอดส์/โรคติดเชื้อเอชไอวี เช่น ritonavir หรือ saquinavir
- ยาสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบบี เช่น telaprevir

หากท่านมีข้อสงสัยควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ของท่านเพื่อขอคำแนะนำ
แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของท่านหากท่านกำลังใช้ยาดังต่อไปนี้

- ยาสำหรับรักษาการติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย
- ยาสำหรับรักษาโรคหัวใจ
- ยาสำหรับรักษาโรคมะเร็ง
- ยาสำหรับรักษาโรคเอดส์/โรคติดเชื้อเอชไอวี
- ยาสำหรับรักษาโรคซึมเศร้า
- ยาสำหรับรักษาโรคทางจิต
- ยาสำหรับรักษาโรคทางเดินอาหาร
- ยาสำหรับรักษาโรคมะเร็ง
- ยาสำหรับรักษาอาการปวด
- ยาสำหรับการบำบัดอาการติดยา

แพทย์ของท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าท่านสามารถใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มได้หรือไม่
หรือหากใช้ควรติดตามผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นต่อหัวใจอย่างใกล้ชิด

แจ้งแพทย์ของท่าน หากท่านกำลังใช้ยาในกลุ่ม anticholinergics (ยารักษาโรคภูมิแพ้ ยารักษาหอบหืด ยารักษาภาวะกลืนปัสสาวะไม่อยู่ ยารักษาอาการปวดเกร็งช่องท้อง ยารักษากล้ามเนื้อหดเกร็ง ยารักษาภาวะซึมเศร้าหรืออาการนอนไม่หลับ ตัวอย่างยากกลุ่ม anticholinergics เช่น dextromethorphan หรือ diphenhydramine) เนื่องจากยาเหล่านี้อาจจะมีผลต่อโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม

แจ้งแพทย์ของท่าน หากท่านกำลังใช้ยาเกี่ยวกับกรดในกระเพาะอาหาร ยาเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม แต่ไม่ควรรับประทานพร้อมกัน ท่านควรรับประทานโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม (ชนิดเม็ด หรือ ชนิดน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน) ก่อนมื้ออาหาร และรับประทานยาเกี่ยวกับกรดในกระเพาะอาหารหลังอาหาร



การควบคุมเครื่องจักรหรือการขับขียานยนต์

ห้ามควบคุมเครื่องจักรหรือขับขียานยนต์ หากท่านรู้สึกเหนื่อย ง่วงนอนหรือมีนงง หลังจากรับประทานยา



ควรรใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มอย่างไรและขนาดเท่าไร

การ ใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มจะได้ประสิทธิผลดีที่สุดหากรับประทานยาก่อนอาหาร 15 ถึง 30 นาที และก่อนนอนหากจำเป็น

ท่านควรรใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มในขนาดที่น้อยที่สุดที่ได้ผลต่อท่าน และไม่ควรรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานหากไม่จำเป็น ปริมาณการ ใช้ยาดังต่อไปนี้ เป็นปริมาณการ ใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม แพทย์ของท่านอาจปรับเปลี่ยนขนาดยาให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละบุคคลได้

การ ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์

เมื่อ ใช้ยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มตามใบสั่งแพทย์ ให้ปฏิบัติตามข้อมูลดังต่อไปนี้

โดยทั่วไป ระยะเวลาในการรักษาสูงสุดไม่ควรเกินหนึ่งสัปดาห์ในการรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียน ควรปรึกษาแพทย์หากอาการคลื่นไส้และอาเจียนคงอยู่นานกว่าหนึ่งสัปดาห์

สำหรับอาการไม่สบายท้อง การไหลย้อนกลับของกรดในกระเพาะอาหารมาที่หลอดอาหาร หรือคลื่นไส้และอาเจียนเนื่องจากการทำเคมีบำบัด (chemotherapy) การทำรังสีบำบัด (radiotherapy) หรือจากการรักษาด้วยยาอื่นๆ ห้ามใช้ยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มนานเกิน 4 สัปดาห์โดยไม่ปรึกษาแพทย์

ขนาดใช้ยาสำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่น (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) น้ำหนักตัวตั้งแต่ 35 กิโลกรัมขึ้นไป และ เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) น้ำหนักตัวตั้งแต่ 35 กิโลกรัมขึ้นไป

ยาเม็ด

- รับประทานยาเม็ดพร้อมน้ำ
- รับประทานยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ถึง 4 ครั้ง
- ไม่ควรรับประทานยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม เกิน 4 เม็ดต่อวัน (40 มิลลิกรัมต่อวัน)

ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน

- ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานบรรจุในขวด โดยใช้ถ้วยตวงยาให้ได้ปริมาณตามที่ได้รับคำสั่งจ่าย
- รับประทานครั้งละ 1 ถ้วยตวงยา (10 มิลลิลิตร) วันละ 3 ถึง 4 ครั้ง
- ไม่รับประทานเกิน 40 มิลลิลิตรต่อวัน (40 มิลลิกรัม/วัน)
ผสมส่วนผสมในขวดให้เข้ากันดีโดยการเอียงขวดไปมาเบา ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟอง

คำแนะนำสำหรับการเปิดขวด: รูปที่ 1

ขวดมาพร้อมกับฝากันเด็กเปิดและควรถูกเปิดดังนี้:

- - กดฝาเกลียวพลาสติกลงในขณะที่หมุนทวนเข็มนาฬิกา
- - ถอดฝาที่คลายเกลียวแล้วออก



ขนาดใช้ยาสำหรับผู้ใหญ่ และวัยรุ่น (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) น้ำหนักตัวน้อยกว่า 35 กิโลกรัม

ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน

- ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานบรรจุในขวด
- ตวงปริมาณที่ถูกต้อง (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของท่าน) จากขวดโดยใช้ปิเปต
- น้ำหนักตัวในหน่วยกิโลกรัมเขียนอยู่บนปิเปต
- ให้รับประทานขนาด 0.25 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 3 ถึง 4 ครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวันเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ห้ามรับประทานเกิน 35 มิลลิกรัมต่อวัน

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

ผสมส่วนผสมในขวดให้เข้ากันดีโดยการเอียงขวดไป
มาเบา ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟอง

คำแนะนำสำหรับการเปิดขวด:

รูปที่ 1 ขวดมาพร้อมกับฝักันเด็กเปิดและควรถูก
เปิดดังนี้:


- กดฝาเกลียวพลาสติกลงในขณะที่หมุน
ทวนเข็มนาฬิกา
- ถอดฝาที่คลายเกลียวแล้วออก



คำแนะนำสำหรับการใช้บีเปิด (ให้มาพร้อมกับขวด
100 มิลลิลิตรเท่านั้น):


รูปที่ 2 จุ่มบีเปิดลงในขวด

ในขณะที่จับวงแหวนด้านล่างไว้ ให้ดึงวง
แหวนด้านบนขึ้นจนถึงเครื่องหมายซึ่ง
เทียบเท่ากับน้ำหนักตัวของท่านในหน่วย
กิโลกรัม



รูปที่ 3 จับวงแหวนด้านล่างไว้ ดึงบีเปิดทั้งอันออก
จากขวด

ปล่อยของเหลวออกจากบีเปิด
ปิดขวด
ล้างบีเปิดด้วยน้ำ



การใช้ยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มในทารกและเด็ก

ยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มสามารถใช้ได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ในกรณีที่เด็กมีน้ำหนักตัวตั้งแต่
35 กิโลกรัมขึ้นไป ห้ามให้ทารกและเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี และมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 35 กิโลกรัม
รับประทานยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม

การใช้ยาโดยไม่มีใบสั่งแพทย์

เมื่อใช้ยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ ให้ปฏิบัติตามข้อมูลดังต่อไปนี้

โดยทั่วไป ระยะเวลาในการรักษาสูงสุดไม่ควรเกินหนึ่งสัปดาห์ในการรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียน ควร
ปรึกษาแพทย์หากอาการคลื่นไส้และอาเจียนคงอยู่นานกว่าหนึ่งสัปดาห์

สำหรับอาการไม่สบายท้อง การไหลย้อนกลับของกรดในกระเพาะอาหารมาที่หลอดอาหาร ห้ามใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มนานเกิน 2 สัปดาห์ ให้ปรึกษาแพทย์ถ้าอาการไม่สบายท้องหรืออาการไหลย้อนกลับของกรดในกระเพาะอาหารมาที่หลอดอาหาร คงอยู่นานเกิน 2 สัปดาห์

ขนาดใช้ยาสำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่น (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) น้ำหนักตัวตั้งแต่ 35 กิโลกรัมขึ้นไป
ยาเม็ด

- รับประทานยาเม็ดพร้อมน้ำ
- รับประทานยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
- ไม่ควรรับประทานยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม เกิน 3 เม็ดต่อวัน (30 มิลลิกรัมต่อวัน)

ทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

ห้ามให้ทารกและเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีรับประทานยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม



ผลไม่พึงประสงค์

ท่านอาจประสบกับผลที่ไม่พึงประสงค์เมื่อใช้โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม โดยรายการด้านล่างคือผลข้างเคียง (หรืออาจเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) ซึ่งสัมพันธ์กับการรักษาด้วยโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม ดังนี้

ผลไม่พึงประสงค์ที่พบน้อย (มีรายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ใน 10000 ราย แต่น้อยกว่า 1 ใน 1000 ราย)

- ชัก

ผลไม่พึงประสงค์ที่พบน้อยมาก (มีรายงานในผู้ป่วยน้อยกว่า 1 ใน 10000 ราย)

- การเคลื่อนไหวที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กล้ามเนื้อสั่น หดเกร็งหรือแข็งตึง รู้สึกกระสับกระส่ายหรืออยู่นิ่งได้ยาก เคลื่อนไหวช้า
- อาการแพ้อย่างรุนแรงที่อาจรวมถึง:
 - ใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้น หรือลำคอบวม
 - มีความลำบากในการกลืนหรือหายใจ
 - ผื่นคัน (ลมพิษ)

- หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- เสียชีวิตโดยไม่คาดคิดที่มีสาเหตุมาจากหัวใจหยุดเต้นกะทันหันในผู้ป่วยที่ทราบหรือไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อน

ให้หยุดการรักษาด้วยโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มและรีบไปพบแพทย์ทันที หากท่านประสบกับผลไม่พึงประสงค์ใดๆ ดังที่ระบุข้างต้น

ผลไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่พบได้ในผู้ที่ได้รับโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม ได้แก่

ผลไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (มีรายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ใน 100 ราย แต่น้อยกว่า 1 ใน 10 ราย)

- ซึมเศร้า
- วิดกกังวล
- สูญเสียความต้องการทางเพศหรือมีความต้องการทางเพศลดลง
- ปวดศีรษะ
- ง่วงนอน
- มีอาการอยู่ไม่สุข
- ท้องเสีย
- ผื่นผิวหนัง
- คัน
- เต้านมขยายหรือบวม
- เจ็บปวดเต้านมหรือกดเจ็บ
- มีน้ำนมไหลจากเต้านมหรือให้นมลำบาก
- รอบเดือนผิดปกติหรือรอบเดือนขาดในผู้หญิง
- รู้สึกอ่อนเพลีย
- ปากแห้ง
- รู้สึกมีนงง

ผลไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (มีรายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ใน 1000 ราย แต่น้อยกว่า 1 ใน 100 ราย)

- ปฏิกริยาภูมิไวเกิน
- ลมพิษ

- มีสารคัดหลั่งที่ผิดปกติไหลจากเต้านม
- ภาวะกายใจไม่สงบ
- กระวนกระวายใจ
- บัสสาวะไม่ออก
- ผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงไป

หากผลไม่พึงประสงค์ดังกล่าวทำให้ท่านกังวล หรือหากท่านพบผลไม่พึงประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน



การได้รับยาเกินขนาด

หากท่านได้รับโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มเกินขนาดท่านอาจมีภาวะกายใจไม่สงบ การรับรู้เปลี่ยนแปลงไปหรือตกอยู่ในภวังค์ ชัก สับสน ง่วงนอน มีการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น มีการเคลื่อนไหวของลูกตาผิดปกติ หรือมีท่าทางผิดปกติ เช่น คอแข็ง หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบพบแพทย์ของท่านทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดกับเด็กเป็นผู้ได้รับยาและมีอาการเหล่านี้

ข้อมูลสำหรับแพทย์ในกรณีที่มีผู้ได้รับยาเกินขนาด

- ยังไม่มียาต้านพิษเฉพาะสำหรับดอมเพอริโดน
- แนะนำให้ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและให้การรักษาตามอาการ
- อาจให้ยากลุ่มแอนติโคลิเนอร์จิกหรือแอนติพาร์กีนสันเพื่อช่วยควบคุมปฏิกิริยาทางระบบประสาท เอ็กซ์ทราพีรามิดัล (extrapyramidal)
- แนะนำให้ติดต่อศูนย์พิษวิทยาเพื่อรับคำแนะนำล่าสุดสำหรับการจัดการการได้รับยาเกินขนาด



ควรเก็บรักษาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มอย่างไร

ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน: เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม: เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยานี้สามารถเก็บไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่ควรใช้ยาโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มหลังจากวันที่ (เดือนและปี) ที่พิมพ์อยู่หลังคำว่า “EXP” บนกล่องหรือแผงยาแม้ว่าจะเก็บยาเป็นอย่างดีก็ตาม แนะนำให้นำยาเก่ามาคืนให้แก่เภสัชกรของท่าน



โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มคืออะไร?

โมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็มเป็นยาที่ช่วยเร่งการเคลื่อนไหวของอาหารให้ผ่านกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้น อาหารจะไม่ตกค้างในทางเดินอาหารเป็นเวลานานเกินไปหรือเกิดการไหลย้อนกลับของอาหาร ตัวยาสำคัญของโมทีเลียมและโมทีเลียม-เอ็ม คือ **ดอมเพอริโดน**

ดอมเพอริโดน เบส

ยาน้ำแขวนตะกอนสีขาวสำหรับรับประทาน

- ในยาน้ำแขวนตะกอน ประกอบด้วยตัวยาดอมเพอริโดน 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
- ใน 1 กล่องประกอบด้วย 1 ขวดซึ่งบรรจุขวดละ 100 มิลลิลิตร (พร้อมปิเปต)
- ปิเปตหนึ่งอันบรรจุยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานได้ 5 มิลลิลิตร ซึ่งเทียบเท่ากับตัวยาดอมเพอริโดน 5 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ในยาน้ำแขวนตะกอนประกอบด้วย methyl-parahydroxybenzoate, microcrystalline cellulose และ sodium carboxymethylcellulose, polysorbate, propyl-parahydroxybenzoate, purified water, sodium hydroxide, sodium saccharin และ sorbitol liquid non crystallising

ดอมเพอริโดน มาลีเอท ชนิดเม็ด

ยาเม็ดกลมมนเล็กห้อยเคลือบฟิล์มสีขาว (ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "JANSSEN" อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร

"^{Mm}
10 ")

- ใน 1 กล่องประกอบด้วย 1 แผงบลิสเตอร์ซึ่งบรรจุแผงละ 30 เม็ด และใน 1 กล่องประกอบด้วย 2 แผงบลิสเตอร์ซึ่งบรรจุแผงละ 10 เม็ด
- ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาดอมเพอริโดน มาลีเอท 12.72 มิลลิกรัมซึ่งเทียบเท่ากับตัวยาดอมเพอริโดน 10 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ในยาเม็ดประกอบด้วย colloidal anhydrous silica, hypromellose, lactose monohydrate, magnesium stearate, maize starch, microcrystalline cellulose, polysorbate, polyvidone, pregelatinized potato starch และ propylene glycol

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด 24 มกราคม 2561

สิ่งที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับยา

ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรของท่านทราบทุกครั้งหากท่านกำลังใช้ยาชนิดอื่นอยู่ เนื่องจากยาบางชนิดไม่ควรใช้ร่วมกัน

การที่ท่านใช้ยาอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยท่านควรทำสิ่งดังต่อไปนี้

- อ่านเอกสารกำกับยาสำหรับคนไข้ฉบับเต็มอย่างเอาใจใส่ทุกครั้ง
- ใช้ยาสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้รับการสั่งจ่ายยาเท่านั้น
- ใช้ยาในปริมาณที่ได้รับการสั่งจ่ายยาเท่านั้น
- ใช้ยาตามระยะเวลาที่ได้รับการสั่งจ่ายยาเท่านั้น

เก็บยาทุกชนิดให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก

ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ยาที่สั่งจ่ายสำหรับท่านและท่านก็ไม่ใช้ยาที่จ่ายสำหรับผู้อื่น

เก็บยาทุกชนิดไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับยาและเก็บยาในที่แห้ง (เช่น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ)

สร้างนิสัยในการคืนยาที่ไม่ใช้แล้วหรือยาเก่าให้เภสัชกรของท่าน

หากมีผู้ได้รับยาเกินขนาดควรรีบนำส่งแพทย์หรือแจ้งหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับความเป็นพิษทันที

ผลิตโดย

โมทีเลียม

Janssen Pharmaceutica NV, Beerse ประเทศเบลเยียม

โมทีเลียม-เอ็ม

Janssen-Cilag S.A., Val De Reuil ประเทศฝรั่งเศส

ชื่อผลิตภัณฑ์	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
โมทีเลียม	1C XXXXX/XX	DDMMYYYY
โมทีเลียม-เอ็ม	1C XXXXX/XX	DDMMYYYY

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์: 0-2792-7200

โทรสาร: 0-2792-7222

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>.