

วิลดากลิปทิน
50 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Vidalin (วิดาลิน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าวิลดากลิปทิน (vildagliptin) มีตัวยา 50 มิลลิกรัม อยู่ในกลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - โรคเบาหวานชนิดที่ 1
 - ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนสูง
 - โรคไตหรืออยู่ระหว่างการฟอกไต
 - โรคตับหรือโรคเกี่ยวกับตับอ่อน
 - โรคหัวใจ
 - กำลังท้อง หรือวางแผนจะท้อง
 - กำลังให้นมลูก หรือวางแผนจะให้นมลูก
 - กินยาอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ยาเบาหวานกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย ยาขับปัสสาวะ ยารักษาไทรอยด์ ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
 - ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี
 - ไม่แนะนำให้ใช้ในคนที่แพ้นม
- “หากท่านไม่แน่ใจว่ามีอาการหรือกินยาโดยอยู่โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอ กินยาของมื้อต่อไปแทน และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากเคยมีอาการเวียนศีรษะหรือมึนงง ควรหลีกเลี่ยง การขับขี่ยานพาหนะ หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกล
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตาม คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีน้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้ เมื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม
- ปวดท้องรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ปวดหลัง ร่วมกับ คลื่นไส้ อาเจียน

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มึนงง ปวดหัว หน้ามืด วูบ ท้องผูก แขนบวม ข้อเท้าบวม เจ็บบริเวณข้อ หรืออาการของน้ำตาลในเลือดต่ำ

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะออกจากแผงเมื่อกินแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นยาเม็ดรูปกลมแบนสีขาวถึงขาวออก เหลือง มีขอบเม็ดลาดเอียงทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร “GF1” อีกด้านหนึ่งเรียบ
- **ตัวยาสำคัญ** วิลดากลิปทิน 50 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ anhydrous lactose (แอนไฮโดรึสแลคโตส) microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส) sodium starch glycolate (โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลท) และ magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต)

ผู้ผลิต บริษัท อินทาสฟาร์มาชูติคอล จำกัด ประเทศอินเดีย
ผู้นำเข้า บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 8 เมษายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
2. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
3. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังการใช้ยานี้
4. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บข้ออย่างรุนแรง (severe joint pain)