

**พาราเซตามอล ความแรง 10 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร/ไอบูโพรเฟน ความแรง 3
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Maxigesic IV
(แมกซี่จีสิค ไอวี)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสมมีตัวยา คือ พาราเซตามอล ความแรง 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และไอบูโพรเฟน ความแรง 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังการผ่าตัดซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องให้ยาทางหลอดเลือดดำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยาแก้ปวด และกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs)
- ⊗ มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลันจากการแพ้ยาแอสไพริน หรือยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs)
- ⊗ หญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ นอกจากแพทย์สั่ง
- ⊗ หญิงให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก
- ⊗ มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ หรือมีแผลทะลุ
- ⊗ เป็นโรคตับ โรคไต อย่างรุนแรง
- ⊗ เป็นโรคไขข้ออักเสบ
- ⊗ ยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นไขข้ออักเสบ หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ
- ⊗ ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจำ
- ⊗ ผ่าตัดบายพาสหัวใจ

- ⊗ มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ หรือเคยมีภาวะหัวใจล้มเหลว
- ⊗ อาเจียนเป็นเลือด เลือดออกทางทวารหนัก อุจจาระมีสีดำเหนียวหรือท้องเสียเป็นเลือด
- ⊗ มีหรือเคยเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
- ⊗ เป็นลำไส้ใหญ่อักเสบ หรือเป็นโรคโครห์น (Crohn)
- ⊗ มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะบวมในผู้ที่เป็โรคหัวใจ ไตทำงานผิดปกติ
 - เป็นความดันโลหิตสูง หรือผู้สูงอายุ
 - หากมีการใช้ยาอื่นๆ อยู่
- ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
- ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการตีบตันของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะเมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- จะได้รับการฉีดยาเข้าหลอดเลือดเป็นหยดอย่างช้าๆ โดยแพทย์และพยาบาลเท่านั้น
- จะได้รับยาทุก 6 ชั่วโมงตามความจำเป็นโดยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดว่าจะต้องได้รับเท่าใด

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร โดยทันที หากท่านลืมมารับยาหรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันทีหรือให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากกำลังจะเริ่มใช้ยาอื่นๆ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

- ระมัดระวังการขับถ่ายยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการคล้ายเป็นหวัด
- มีไข้ มีการหลุดลอกบริเวณเยื่อต่างๆ เช่น ในช่องปาก ลำคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อตาอักเสบ ให้หยุดยาเพราะอาจเป็น Stevens-Johnson syndrome
- มีเลือดออกจากทางด้านหลัง
- ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือท้องเสียเป็นเลือด
- หอบหืด หายใจมีเสียงวี๊ด หอบเหนื่อย คั้นกะทันหันหรือรุนแรง
- แผลพุพองรุนแรงและมีเลือดออกที่ริมฝีปาก ตา ปาก จมูก และอวัยวะเพศ (กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน)
- อาเจียนเป็นเลือดหรือมีลักษณะเหมือนกาแฟบด
- มึนงง ปากหรือตาตกรุนแรง ปวดลำบากหรือเป็นอัมพาต
- อาการเจ็บหน้าอกอย่างฉับพลัน
- หอบ หายใจลำบากเมื่อนอนราบ หรือเท้าหรือขาบวม
- ปวดท้องรุนแรงหรือกดเจ็บ
- ตาพร่ามัว ตาแดง เจ็บตา คัน
- เลือดออกหรือช้ำง่ายกว่าปกติ มีจุดแดงหรือม่วงใต้ผิวหนัง
- ผิวหนังและ/หรือตาเหลืองหรือที่เรียกว่าดีซ่าน
- น้ำหนักขึ้นผิดปกติ
- ปวดศีรษะรุนแรงหรือต่อเนื่อง
- หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ เรียกอีกอย่างว่าใจสั่น
- กระหายน้ำมากเกินไป อ่อนแรง เหนื่อยง่าย

**“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- รู้สึกไม่สบาย มีไข้ ตัวร้อน คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดหัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องผูก ท้องร่วง
- เป็นตะคริว เป็นลม เวียนศีรษะ หน้ามืด ขา
- นอนไม่หลับ
- เหงื่อออกมากเกินไป

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** พาราเซตามอล และไอบูโพรเฟน
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Mannitol (แมนนิทอล), Disodium phosphate dihydrate (ไดโซเดียมฟอสเฟต ไดไฮเดรต), Cysteine hydrochloride Monohydrate (ซิสเทอีนไฮโดรคลอไรด์โมโนไฮเดรต), Hydrochloric acid (กรดไฮโดรคลอริก), Sodium hydroxide (โซเดียมไฮดรอกไซด์), Water for injection (น้ำบริสุทธิ์สำหรับฉีด), Nitrogen (ไนโตรเจน)

ผู้ผลิต บริษัท S.M Farmaceutici SRL ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด

เลขที่ 128 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 9 กันยายน 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>



- <http://ndi.fda.moph.go.th/>



**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**