

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

PIL-careless weed

น้ำยาสกัดจาก

Amatanthus hybridus

ความแรง 0.014 g/ml

ชนิดยาน้ำใส

AllerVACtest® CARELESS WEED

(อัลเลอร์แวกซ์เทสต์® วัชพืช)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า *Amatanthus hybridus* Allergen Extract มีตัวยา 0.014 g/ml

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยสำหรับโรคภูมิแพ้เกสร วัชพืช ผักโขม ด้วยวิธีสะกิด (skin prick test)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ส่วนประกอบอื่นๆของยานี้ ที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญตามที่ระบุในหัวข้อที่ 7
- ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาแก้แพ้เป็นประจำ
- ผู้ป่วยที่มีโรคทางผิวหนัง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
 - ผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่มต่อไปนี้ Beta-blocker เช่น ยา Atenolol ที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ ACEI เช่น ยา enalapril ที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง

- ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดอาการแพ้แบบเฉียบพลันรุนแรงจากการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดมาก่อน
- ผู้ป่วยที่เกิดภาวะลมพิษหลังจากโดนขีดข่วนที่ผิวหนัง หรือที่เรียกว่า Dermatographis
- ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บเค้นหน้าอก เนื่องจากหัวใจขาดเลือด
- ผู้ป่วยที่รับประทานยาด้านฮีสตามีน (Anti histamine) และยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) ทั้งรูปแบบใช้ภายใน (ขนาดมากกว่า 20 มก./วัน) และรูปแบบใช้ภายนอก ต้องหยุดใช้ยาดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการทดสอบ เนื่องจากอาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- การใช้ยาตรวจวินิจฉัยภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิด จะกระทำภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ซึ่งมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้น
- การใช้ยานี้ แพทย์ผู้ทำการทดสอบ จะทำการหยดน้ำยา 1 หยดลงบนผิวหนังที่ทำความสะอาดแล้ว หลังจากนั้นใช้เข็มสะกิดเบาๆ ผ่านหยดสารและให้อยู่ในชั้นหนังกำพร้า หรือใช้อุปกรณ์เฉพาะโดยไม่ให้มีเลือดออก หลังจากนั้นจึงเช็ดน้ำยาออก จากนั้นรออ่านผลโดยที่ น้ำยาควบคุมผลบวกอ่านผลหลังการทดสอบ 10-15 นาที น้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ (Allergen extract) อ่านผลหลังการทดสอบ 15-20 นาที

หากมีอาการแพ้ จะเกิดผื่นแดง และรอยนูนตรงตำแหน่งที่ทดสอบ

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- เนื่องจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นการให้ผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดอาการคัน ซึ่งจะลดลงหลังการทดสอบ แต่หากมีอาการคันมากสามารถใช้แอลกอฮอล์เช็ด ยกเว้นกรณีผิวหนังหรือมีสภาวะที่ไม่สามารถสัมผัสแอลกอฮอล์ อาจทาครีมเพื่อลดอาการคันได้ เช่น ครีมที่มีส่วนผสมของยูเรีย หรือ unction หรือให้รับประทานยาแก้แพ้

แต่หากเกิดปฏิกิริยาแพ้ทั่วๆไป ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังจากจากเริ่มการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิด ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแลต่ออีกอย่างน้อย 20 นาทีหลังการทดสอบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษบวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืดเป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดงตุ่มพองผิวหนัง หลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5. อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

- เกิดผื่นแดง และรอยนูน ตรงตำแหน่งที่ทดสอบซึ่ง เป็นเรื่องปกติ หากเกิดผลบวกจากการทดสอบ
- อาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในผู้ทดสอบได้เช่น เป็นลม เวียนศีรษะ นอกจากนี้อาจเกิดการบวมบริเวณที่ ทดสอบทำให้เกิดการปวดตามมาได้

“หากมีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยาน้ำใส ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อนบรรจุโดยวิธีปราศจาก เชื้อในขวดแก้วสีชา ขวดละ 2 มิลลิลิตร

ส่วนประกอบสำคัญคือ

Amaranthus hybridus Allergen Extract

0.014 g/ml

ส่วนประกอบอื่นๆในตำรับได้แก่

Sodium chloride

Dibasic sodium phosphate

Monobasic potassium phosphate

Phenol

Glycerin

Water for injection

ผู้ผลิต : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร็ดเตอร์ฟาร์มา จำกัด
 เลขที่ 55/2,55/11 หมู่ที่ 1 ถนนบางเตย-วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร. 0-28868190-9

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
 หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

Version 29 October 2018

เอกสารสำหรับตรวจติดตามข้อมูลในเอกสารกำกับยาAllerVACtest® CARELESS WEED

ข้อมูลยืนยันตัวตนเอกสารกำกับยา

หัวข้อ	ข้อมูล
Trade Name	AllerVACtest® CARELESS WEED
Generic name	Amatanthus hybridus Allergen Extract
Dosage form	Solution
Strength	0.014 g/ml
TMT-TPU	-
WHO ATC	V01AA03
Update date	
PIL version	

ข้อมูลผู้จัดทำเอกสารกำกับยา

หัวข้อ	ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบหลัก	Tharit Moohummad

Version 29 October 2018

เอกสารอ้างอิง

	ชื่อฐานข้อมูล	ชื่อผลิตภัณฑ์	Last update	Access date
1	SmPC	-SmPC ของ AllerVACtest CARELESS WEED		
2	eMC - PIL	Prick Test Solutions Allergen Extracts for Skin Prick Testing https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.8017.pdf	01/2017	02/2019
3	IBM Micromedex	-		
4	Lexicomp	-		

Content tracking

ส่วนต้นของเอกสาร

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่นำไปใช้ใน PIL
SmPC . ชื่อผลิตภัณฑ์ อัลเลอร์แวกเทสต์® วัชพืช 2. ชื่อและความแรงของตัวยาสำคัญ น้ำยาสกัดจาก Amaranthus hybridus 0.014 g/ml 3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ น้ำใส ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน	น้ำยาสกัดจาก Amaranthus hybridus ความแรง 0.014 g/ml ชนิดยาน้ำใส AllerVACtest® CARELESS WEED (อัลเลอร์แวกเทสต์® วัชพืช)

1. ยานี้คือยาอะไร

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่นำไปใส่ใน PIL
SmPC น้ำยาสกัดจาก <i>Amaranthus hybridus</i>	1.1 ยานี้มีชื่อว่า Amaranthus hybridus Allergen Extract มีตัวยา 0.014 g/ml
SmPC 5. ข้อบ่งใช้ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้สงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เกสรวัชพืชผักโขมด้วยวิธีสะกิด (skin prick test)	1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร ยานี้ใช้เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้สงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เกสรวัชพืชผักโขมด้วยวิธีสะกิด (skin prick test)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่นำไปใส่ใน PIL
SmPC ข้อห้ามใช้ห้ามทำการทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพ้โดยการสะกิดกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหยุดยา antihistamine ได้ และผู้ป่วยที่มีภาวะ generalized skin disease หรือ dermatographism, สตรีมีครรภ์, ผู้ป่วย unstable angina หรือผู้ที่มีประวัติการเกิด anaphylaxis ในการทดสอบทางผิวหนังมาก่อน ห้ามทำการทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพ้โดยการสะกิดใน ผู้ป่วยที่ได้รับยา beta- blockers และ angiotensin converting enzyme(ACE) inhibitor เนื่องจากอาจรบกวนการตอบสนองต่อการรักษาด้วย adrenaline(epinephrine)กรณีเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทั่วกาย(Systemic reaction) Pregnancy Category : C	2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร <ul style="list-style-type: none"> เคยแพ้ส่วนประกอบอื่นๆของยานี้ ที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาแก้แพ้เป็นประจำ ผู้ป่วยที่มีโรคทางผิวหนัง 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> เมื่อตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่มต่อไปนี้ Beta-blocker เช่น ยา Atenolol ที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ

	<p>ACEI เช่น ยา enalaprilที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ป่วยที่รับประทานยาด้านฮีสตามีน (Anti histamine) ยาากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) ทั้งรูปแบบใช้ภายใน และรูปแบบใช้ภายนอก ต้องหยุดใช้ยาดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการทดสอบ เนื่องจากอาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้ • ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดอาการแพ้แบบเฉียบพลันรุนแรงจากการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดมาก่อน • ผู้ป่วยที่เกิดภาวะลมพิษหลังจากโดนขีดข่วนที่ผิวหนัง หรือที่เรียกว่า Dermatographism • ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บเค้นหน้าอก เนื่องจากหัวใจขาดเลือด
--	--

3. วิธีใช้ยา

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่นำไปใส่ใน PIL
<p>e-MC PIL</p> <p>The prick test will be performed under the supervision of a qualified doctor. They will be equipped with full facilities for cardiorespiratory resuscitation to deal with any severe reaction to the test.</p> <p>SmPC</p> <p>6.ขนาดยาที่แนะนำ และวิธีการใช้ยา</p>	<p>3.1 ขนาดและวิธีใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เกสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค • การใช้ยาตรวจวินิจฉัยภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิด จะกระทำภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ซึ่งมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้น

<p>หยดน้ำยา 1 หยดลงบนผิวหนังของผู้ป่วยที่ทำความสะอาดแล้ว ใช้เข็มสะกิดเบาๆ ผ่านหยดสารและให้อยู่ในชั้นหนังกำพร้า หรือใช้อุปกรณ์เฉพาะโดยไม่ให้มีเลือดออก หลังจากนั้นจึงเช็ดน้ำยาออก จากนั้นรออ่านผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีน้ำยาควบคุมผลบวก(Histamine) อ่านผลหลังการทดสอบ 10-15 นาที - กรณีน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ (Allergen extract) อ่านผลหลังการทดสอบ 15-20 นาที 	<ul style="list-style-type: none"> • การใช้ยานี้ แพทย์ผู้ทำการทดสอบ จะทำการหยดน้ำยา 1 หยดลงบนผิวหนังที่ทำความสะอาดแล้ว หลังจากนั้นใช้เข็มสะกิดเบาๆ ผ่านหยดสารและให้อยู่ในชั้นหนังกำพร้า หรือใช้อุปกรณ์เฉพาะโดยไม่ให้มีเลือดออก หลังจากนั้นจึงเช็ดน้ำยาออก จากนั้นรออ่านผลโดยที่ - น้ำยาควบคุมผลบวกอ่านผลหลังการทดสอบ 10-15 นาที - น้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ (Allergen extract) อ่านผลหลังการทดสอบ 15-20 นาที <p>หากมีอาการแพ้ จะเกิดผื่นแดง และรอยนูนตรงตำแหน่งที่ทดสอบ</p>
<p>-</p>	<p>3.2 หากลิมินยาควรทำอย่างไร</p> <p>-</p>
<p>SmPC</p> <p>12. การได้รับยาเกินขนาด และวิธีการรักษา</p> <p>เนื่องจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นการให้ผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดอาการคัน ซึ่งจะลดลงหลังการทดสอบ แต่หากมีอาการคันมากสามารถใช้แอลกอฮอล์เช็ด ยกเว้นกรณีผิวหนังแห้งหรือมีสภาวะที่ไม่สามารถสัมผัสแอลกอฮอล์อาจทาครีมเพื่อลดอาการคันได้ เช่น ครีมที่มีส่วนผสมของยูเรีย หรือ ถูน้ำแข็ง(Ice-pack) หรือให้รับประทานยา antihistamine</p> <p>แต่หากเกิดปฏิกิริยาแพ้ทั่วกาย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแล</p>	<p>3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร</p> <p>เนื่องจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นการให้ผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดอาการคัน ซึ่งจะลดลงหลังการทดสอบ แต่หากมีอาการคันมากสามารถใช้แอลกอฮอล์เช็ด ยกเว้นกรณีผิวหนังแห้งหรือมีสภาวะที่ไม่สามารถสัมผัสแอลกอฮอล์อาจทาครีมเพื่อลดอาการคันได้ เช่น ครีมที่มีส่วนผสมของยูเรีย หรือ ถูน้ำแข็งหรือให้กินยาแก้แพ้</p> <p>แต่หากเกิดปฏิกิริยาแพ้ทั่วกาย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแล</p>

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
SmPC 8. คำเตือนและข้อควรระวัง ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแลต่ออีกอย่างน้อย 20 นาที หลังการทดสอบ	หลังจากจากการเริ่มการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิด ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแลต่ออีกอย่างน้อย 20 นาทีหลังการทดสอบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
e-MC PIL Get urgent medical treatment immediately if you notice a severe allergic reaction, known as anaphylactic shock, after having the prick test. Symptoms include: • General itching and feeling of heat – especially affecting scalp, mouth, throat, palms or soles • Severe wheezing, or noisy or difficult breathing • Severe hives/nettle rash • Swelling of the lips or throat • Pale or greyish skin colour • A fast heart beat	5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบแจ้งแพทย์ทันที • บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ • หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก • ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผื่นหนัง หรือเลือดออก ผิดปกติ • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

<ul style="list-style-type: none"> Faintness or collapse 	
<p>SmPC</p> <p>11. อาการไม่พึงประสงค์</p> <p>แม้การทดสอบภูมิแพ้แบบ skin prick test ถือว่ามีความปลอดภัย มีอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แบบปฏิกิริยาแพ้ทั่วกาย (systemic reaction) 0.03 % อัตราการเกิดปฏิกิริยาแพ้รุนแรงน้อยกว่า 0.02%และยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นการให้ผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้โดยตรง ดังนั้นการเกิดผลบวกในรูปแบบผื่นแดง (flare)และรอยนูน (wheal) ตรงตำแหน่งที่ทดสอบจึงเป็นเรื่องปกติอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้ทดสอบที่มีความกังวลอาจเกิดขึ้นได้เช่น เป็นลม เวียนศีรษะ ดังนั้นการทดสอบภูมิแพ้ควรทำในสถานที่มียุอุปกรณ์และยาที่จะใช้รักษาอยู่พร้อม นอกจากนี้อาจเกิดการบวมบริเวณที่ทดสอบ(the late phase response) ทำให้เกิดการปวด ซึ่งมักเกิดจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยวิธีฉีดเข้าผิวหนัง(Intradermal testing) มากกว่า</p>	<p>5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ...</p> <p>เกิดผื่นแดง และรอยนูน ตรงตำแหน่งที่ทดสอบซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากเกิดผลบวกจากการทดสอบ อาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในผู้ทดสอบได้เช่น เป็นลม เวียนศีรษะ นอกจากนี้อาจเกิดการบวมบริเวณที่ทดสอบทำให้เกิดการปวดตามมาได้</p> <p>หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์</p>

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
<p>Special precautions for storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว เก็บยาให้พ้นมือเด็ก เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
	<p>ผู้ผลิต: บริษัทโรงงานเภสัชกรรมเกร็ดเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด</p>

Version 29 October 2018

	เลขที่ 55/2,55/11 หมู่ที่ 1 ถนนบางเตย-วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร. 0-28868190-9
	เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Active ingredient (AllerVACtest® CARELESS WEED)

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	CAS no.	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
-	-	<i>Amaranthus hybridus</i> Allergen Extract

Inactive ingredient (AllerVACtest® CARELESS WEED)

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	CAS no.	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
-	7440-23-5	Sodium chloride
-	7558-79-4	Dibasic sodium phosphate
-	7778-77-0	Monobasic potassium phosphate
-	108-95-2	Phenol
-	56-81-5	Glycerin
-	7732-18-5	Water for injection

