

## บรีกาทีนิน

ความแรง 30, 90, 180 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Alunbrig (อลันบริก)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า บรีกาทีนิน (brigatinib)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ—รักษาโรคมะเร็งปอดบางชนิดที่เคยรักษาด้วยยาคริโซทีนิน และแพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา ในกรณีต่อไปนี้ ปอดอักเสบ หายใจลำบาก ผู้ที่มีปัญหาที่ปอด ดับอ่อน ดับ ไต เบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
- หญิงมีครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพรบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
  - ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวีบางชนิด
  - ยาปฏิชีวนะบางชนิด
  - ยารักษาเชื้อราบางชนิด
  - ยาลดไขมันบางชนิด
  - ยากันชักบางชนิด
  - ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด
  - อื่นๆ

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ห้ามหัก บด เคี้ยว หรือละลายยา
- สามารถกินก่อนหรือหลังอาหารได้

#### 3.2 หากลืม กิน ยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้า กิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้ต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ห้ามหัก บด เคี้ยว หรือละลายยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- การมองเห็นผิดปกติ
- บวมที่ใบหน้าหรือแขน ขา
- ความดันโลหิตสูง หรือมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนล้า ท้องเสีย ไอ ปวดศีรษะ ท้องผูก ปวดท้อง ปากแห้ง และอาหารไม่ย่อย

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ไม่ควรทิ้งยาในท่อน้ำเสียภายในบ้าน ถ้าไม่ใช้ยาดังกล่าวแล้ว ให้สอบถามเภสัชกรถึงวิธีการทิ้งยาเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยาอลันบริกมี 3 ความแรง

- อลันบริก 30 มิลลิกรัม** ลักษณะยาเม็ดกลมสี ขาวถึงสีขาวนวล ด้านหนึ่งมีอักษร “U3” อีกด้านหนึ่งเรียบ
- อลันบริก 90 มิลลิกรัม** ลักษณะยาเม็ดยาวรีสี ขาวถึงสีขาวนวล ด้านหนึ่งมีอักษร “U7” อีกด้านหนึ่งเรียบ
- อลันบริก 180 มิลลิกรัม** ลักษณะยาเม็ดยาวรีสี ขาวถึงสีขาวนวล ด้านหนึ่งมีอักษร “U13” อีกด้านหนึ่งเรียบ

**ส่วนประกอบยา** คือ แล็กโทสโมโนไฮเดรต ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส โซเดียมสเตียเรตไฮดรอกไซด์ เอ ซิลิกาไดออกไซด์ไฮดรอกไซด์ แมกนีเซียมสเตียเรต และสารเคลือบเม็ดยา

ผู้ผลิต Penn Pharmaceutical Services Limited,  
Gwent, สหราชอาณาจักร  
ผู้นำเข้า บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  
จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 เมษายน 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

