

เจมมิกลิพติน ความแรง 50 มิลลิกรัม และเมท  
ฟอร์มิน ความแรง 1000 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด  
เคลือบฟิล์ม  
ชื่อการค้า Zemimet® SR Tab. 50/1000 mg  
(ยาเม็ดเซมมิเมท เอสอาร์ 50/1000 มก.)

## 1. ยานี้คือยาอะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยาคือ เจมมิกลิพตินทาร์เทรตเซสควิไฮเดรต (gemigliptin tartrate sesquihydrate) และเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ (metformin hydrochloride)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยา หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- เป็นโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง หรือต้องฉีดอินซูลิน
- เป็นโรคหัวใจล้มเหลว ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง
- แพทย์แจ้งว่ามีภาวะเลือดเป็นกรด หรือเป็นโรคไตระดับรุนแรง หรือโรคตับ
- มีภาวะเสี่ยงที่ลดการทำงานของไต เช่น ขาดน้ำ เสียของอย่างรุนแรง ดิดเชื้อรุนแรง ข้อค ต้องตรวจร่างกายโดยการฉีดสารทึบรังสีที่มีไอโอดีน
- ดิดเหล้า หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก

## 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีที่ท่านมีภาวะดังต่อไปนี้
  - เคยแพ้ยาเบาหวานในกลุ่มนี้
  - เป็นโรคหัวใจ
  - กำลังตั้งท้อง หรือให้นมลูก
  - มีหรือเคยมีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
  - มีประวัติปวดข้อ หรือข้ออักเสบอย่างรุนแรงที่เกิดจากการใช้ยาเบาหวานบางชนิด
  - กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือเพิ่งผ่าตัดเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง
  - แจ้งแพทย์ ถ้ากำลังใช้ยาเบาหวานชนิดอื่นอยู่ **เพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ**
  - แจ้งแพทย์ ถ้ากำลังใช้ยาดังต่อไปนี้ ยาฆ่าเชื้อรา · ยารักษาวัณโรค · ยาแก้นชัก · ยาสแตียรอยด์ · ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สแตียรอยด์ · ยาขยายหลอดลม · ยาขับปัสสาวะ · ยาลดความดัน · ยาต้านการแข็งตัวของเลือด · ยารักษาไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ · ยารักษาโรคไต

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละ 1 ครั้งพร้อมอาหารมื้อเย็น โดยกินยาทั้งเม็ด
- ห้ามแบ่ง บด เคี้ยวเม็ดยา

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้เมื่อข้ามวันแล้ว ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ และพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง
- แจ้งแพทย์ทุกครั้งหากต้องเอกซเรย์ หรือฉีดสารทึบรังสีที่มีไอโอดีน หรือจะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยานี้
- ควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำ ร่วมกับกินยานี้ด้วย
- ระมัดระวังการขับซึรด ทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง **เพราะยานี้อาจทำให้ระดับน้ำตาลต่ำจนใจสั่น รู้สึกหิว มึนงง จนเกิดอันตรายได้**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- เกิดภาวะเลือดเป็นกรด สังเกตจากมีอาการเป็นตะคริวอย่างรุนแรง อาเจียนรุนแรง ปวดท้อง หายใจลำบาก รู้สึกไม่สบายร่วมกับเหนื่อยมากผิปกติ ตัวเย็น หัวใจเต้นช้า
- ปวดท้องอย่างรุนแรง ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้
- ใจสั่น แขนขาอ่อน หมดสติ เหงื่อออกตัวเย็น **“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ หรือพาไปส่งที่โรงพยาบาลทันที”**

## 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ง่วงซึม มึนงง หิวมาก แต่หากมีอาการรุนแรงขึ้น ให้แก้ไขเบื้องต้นด้วยการอมลูกอมหรือกินน้ำตาลหวานก่อน
- ปวดหัว ท้องอืด ท้องเสีย เบื่ออาหาร ลึนรับรสผิดปกติ

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงแดดโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เม็ดกลมเคลือบฟิล์มสีแดงอ่อน
- ตัวยาสำคัญ เจมมิกลิฟดินทาร์เทรตเซสควิไฮเดรต (เทียบเท่าเจมมิกลิฟดิน 50 มิลลิกรัม) และเมทฟอรัมไฮโดรคลอไรด์ 1000 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ
  - ยาเม็ดแกน: ไมโครคริสตอลไลน์เซลลูโลส (ชนิด 102), คลอสคาร์เมลโลสโซเดียม, สเตียริลฟูมาเรตโซเดียม, แมกนีเซียมสเตียเรต, สารแขวนตะกอนโพลีไวนิลอะซีเตทในน้ำ ความเข้มข้น 30%, ไฮโปรมेलโลส 2208, โอปาตริล II 85F437
  - ฟิล์มเคลือบ: โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไทเทเนียมไดออกไซด์, โพลีเอธิลีนไกลคอล 3350, ทัลคัม, เรดโอโรนอนออกไซด์

## ผู้ผลิต

บริษัท แอลจี เคมี จำกัด ประเทศเกาหลีใต้

## ผู้นำเข้า

บริษัท แอลจี เคมี ไลฟ์ ไชเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย

## ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท แอลจี เคมี ไลฟ์ ไชเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย

**เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2565**

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Ma.in.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**