

## เออร์โลทีนิบ ความแรง 100 และ 150 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ชื่อการค้า ZYCEVA (ไซเซวา)

### 1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร  
ยานี้มีชื่อว่า เออร์โลทีนิบ (Erlotinib) มีตัวยา 100, 150 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มรักษามะเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้ทำอะไร  
  - ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดใหญ่ที่ไม่เล็กตามแพทย์สั่ง
  - ยานี้ใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดในการรักษามะเร็งตับอ่อนที่แพร่กระจาย

### 2. ข้อควรระวัง

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร  
  - ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้  
**ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้**
  - แพ้หน้าตาแลคโตส
  - กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
  - ก่อนทำการรักษาหรือใช้ยานี้
  - กำลังใช้ยาต่อไปนี้ ได้แก่ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยากันชัก ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาควบคุมไขมันในเลือด กลุ่มสเตติน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตราย
  - ใส่คอนแทคเลนส์หรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับ ดวงตา มาก่อน เช่น ตาแดง กระจุกตาอักเสบ หรือแพ้แสงตา

**คำเตือน:** ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

### 3. วิธีใช้ยา

3.1-ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ ชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาวันละ 1 ครั้ง โดยกินก่อนอาหารเช้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังกินอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากกินทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก ไอ มีไข้ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากคุณตั้งท้องในระหว่างที่รักษาด้วยยานี้ ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษบวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ ปวดท้องรุนแรง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บิลิรูบินสูง
- มีสภาวะน้อย หรือปัสสาวะไม่ออก
- ตาแดงผิดปกติ หรือเจ็บในตา
- หายใจลำบากร่วมกับอาการไอหรือมีไข้
- มีอาการชา เหน็บ ตาพร่า
- มีจุดแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน เมื่ออาหาร น้ำหนักลด
  - นำตาไหลผิดปกติ ตาพร่า ตาไม่สู้แสง มีแผลในปาก หรือที่ริมฝีปาก
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อยาให้โดนแสงแดดโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องนำ ห้องครัว ครัวและยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อนเพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

**ไซเซวา 100 มิลลิกรัม** เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม กลม สีขาวถึงขาวนวล มีม'914' อยู่ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเรียบ

**ไซเซวา 150 มิลลิกรัม** เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม กลม สีขาวถึงขาวนวล มีม'915' อยู่ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเรียบ

#### ส่วนประกอบของยานี้:

ตัวยาคือ เออร์โลทีนิบ ไฮโดรคลอไรด์ ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ Lactose Monohydrate, Microcrystalline cellulose 101, Microcrystalline cellulose 102, Sodium lauryl sulfate, Crospovidone (Type-A), Crospovidone (Type-B), Hypromellose-6 CPS-2910, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Opadry White และ Purified Water

**ผลิตโดย** Cadila Healthcare Limited, India

**ผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย:** บริษัท ฟาร์มาแลนด์(1982) จำกัด, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** 8 ตุลาคม 2563

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ** **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**

**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้**