

วอร์ท็อกซีทีน
ความแรง 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชนิดสารละลาย
ชื่อการค้า Brintellix oral drops
(บรินเทลิกซ์ ชนิดหยด)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า วอร์ท็อกซีทีน (Vortioxetine) เป็นยาในกลุ่มยาด้านซึมเศร้า

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคซึมเศร้าในผู้ใหญ่ซึ่งแพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- × ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กินยาด้านซึมเศร้าตัวอื่นอยู่

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีดังต่อไปนี้

- กำลังกินยาทรามาดอลและยาแก้ปวดอย่างแรง ซุมามทริปแทนและยาที่ลงท้าย"ทริปแทน"
- เคยมีอาการชัก
- มีอาการมึนงงหรือก้าวร้าวผิดปกติ
- เลือดออกหรือช้ำง่าย
- รู้สึกมึนงง อ่อนเพลีย สับสน ง่วงนอน (โซเดียมในเลือดต่ำ)
- อายุ 65 ปีหรือมากกว่า
- ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุ 7-11 ปี และวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี
- เป็นโรคตับหรือโรคไต
- เคยเป็น หรือกำลังเป็นต่อหิน
- มีอาการก้าวร้าว กระสับกระส่าย โกรธและหงุดหงิดเมื่อใช้ยาด้านซึมเศร้ารวมถึงวอร์ท็อกซีทีน
- มีความคิดทำร้ายร่างกายหรือฆ่าตัวตาย ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มรับยาด้านซึมเศร้า
- อาจทำให้ผลตรวจเมตาโดนในปัสสาวะเป็นบวก

- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ร่วมกับแอลกอฮอล์
- ไม่แนะนำให้ใช้ยาในหญิงกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะมีลูก
- กำลังให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ เช่น ฟิเนลซีน ไอโพรโนอาซิด ไอโซคาร์บอนกซาซิด ในลาไมด์ ทรานิลไซโปรมีน โมโคลบีไมด์ เซเลกิลีน ราชากิลีน ไลนิโซลิด ลิเทียม ทริป-โตเฟน ไรแฟมพิซิน คาร์บามาซีปีน เฟนิโทอิน วอร์ฟาริน ไดไพริดาโมล เฟนิโปรควมอน อะซีติลซาลิไซลิกขนาดต่ำ ยาที่ทำให้โซเดียมต่ำ
- ยาที่เพิ่มความเสี่ยงการชัก คือ ซุมามทริปแทน ทรามาดอล เมโพลควิน บูโพรพิออน ฟลูออกซีทีน พาร็อกซีทีน เซนตัจอห์นเวิร์ต ควินิดีน คลอโรปรีมาซีน คลอโปรไทซีน ฮาโลเพริดอล

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาที่แนะนำคือ 10 มิลลิกรัม วันละครั้งในผู้ใหญ่อายุน้อยกว่า 65 ปี อาจเพิ่มขนาดยาได้ถึง 20 มิลลิกรัมและลดได้ถึง 5 มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นกับการตอบสนองต่อยา
- ขนาดยาเริ่มต้นในผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า คือ 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง
- ขนาดยา 5 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับยา 5 หยด
ขนาดยา 10 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับยา 10 หยด
ขนาดยา 15 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับยา 15 หยด
ขนาดยา 20 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับยา 20 หยด
- กินยาพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ สามารถผสมยากับน้ำดื่ม น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่ควรผสมกับยาอื่น
- หมุนขวดคว่ำลง หากไม่มียาไหลออกมาให้เคาะขวดเบาๆ



3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

กินยาครั้งถัดไปในเวลาเดิม ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- พบแพทย์ทันทีและนำขวดยาที่เหลือไปด้วย แม้จะไม่มีอาการผิดปกติ
- อาจมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้ ท้องเสีย คันทั่วร่างกาย ง่วงนอนและหน้าแดงได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยาตามแพทย์สั่ง ใช้ยาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่อาการจะดีขึ้น
- ควรรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ภายหลังอาการดีขึ้นแล้ว
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร**
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัว

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ
- หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก กลืนลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- โซเดียมในเลือดต่ำ ทำให้รู้สึกมึนงง อ่อนเพลีย สับสน ง่วงนอน อาจหน้ามืด ชักหรือล้มได้ กลุ่มอาการเซโรโทนิน (เช่น เห็นภาพหลอน กระตุก หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง มีไข้ คลื่นไส้และท้องเสีย) ลมพิษ เลือดออกมาก (รวมถึงช้ำ เลือดออกที่จมูก เลือดออกที่ทางเดินอาหารและมดลูก) ผื่น นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย ก้าวร้าว
- ปวดศีรษะ
- สอริโมนโปรแลคตินในเลือดเพิ่มขึ้น

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่**ไม่จำเป็นต้องหยุดยา** แต่ถ้ามีอาการ

รุนแรงให้ไปพบแพทย์

• คลื่นไส้ ท้องเสีย ท้องผูก

• อาเจียน เวียนศีรษะ

• คื่นท้วร่างกาย

• ผื่นผดผื่น

• หงื่อออกมาก

• หน้าแดง

• ไข้

• ทรมาณตาขยาย

“**ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงแดดโดยตรง
- โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- หลังจากเปิดแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 8 สัปดาห์

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นสารละลายใส ไม่มีสีถึงสีเหลือง
 - **ตัวยาสำคัญ** ได้แก่ วอร์ทีออกซีทีน ในแต่ละหยดประกอบด้วยวอร์ทีออกซีทีน 1 มิลลิกรัม (ในรูปของเกลือ (ดี, แอล)-แลคเตท) แต่ละขวดประกอบด้วยบรินเทลิกซ์ 15 มิลลิลิตร
 - **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ ไฮดรอกซีโพรพิล เบต้าเดกซ์ hydroxypropylbetadex, เอทานอล (ethanol (96%)) และ น้ำ (purified water)
- ผู้ผลิต H. Lundbeck A/S, ประเทศเดนมาร์ก
ผู้นำเข้า บริษัท บี.อี.แอล. จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทร 02-4370154
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

• <https://ndi.fda.moph.go.th/>

1.

2

2

2

2

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร