

โวริโคนาโซล

ความแรง 200 มิลลิกรัม
ผงยาสำหรับผสมเพื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Vorivite (โวริวิต)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โวริโคนาโซล (voriconazole) มีตัวยา 200 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อรา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยาต้านเชื้อราในกลุ่มอิมิดาโซล เช่น คีโตโคนาโซล ไอโทรโคนาโซล และฟลูโคนาโซล
- ห้ามใช้ยานี้ ร่วมกับ ยาดังต่อไปนี้
ซีซาไพร์ด คริวดิน ริแฟมพิซิน เอฟาไวเรนซ์ คาร์บามาซีพีน ฟิโนบาร์บิทอล เออร์โกทามีน เซอร์โรโลมูส ริโทนาเวียร์ สมุนไพรรักษาเชื้อรา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
 - เป็นโรคตับบกพร่อง
 - เป็นโรคไตบกพร่อง
 - การมองเห็นผิดปกติ
 - เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
 - ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจมีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลผสมยานี้ก่อนให้ยาท่าน ด้วยการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยาอาจทำให้ การมองเห็นไม่ชัดเจน
- หลีกเลี่ยงการได้รับแดดโดยตรง ให้สวมเสื้อแขนยาวและใช้สารกันแดดที่มีค่า SPF มากกว่า 30 ขึ้นไป เพราะยานี้ อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสง และเกิดอาการไหม้แดดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจหยุดเต้น
- การมองเห็นไม่ชัดเจน ดวงตาไวต่อแสง หรือ อาการกลัวแสง

“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
- มีไข้ ปวดหัว
- แขนบวม

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ในโรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ผงยาที่ละลายแล้วควรใช้ทันที หากจำเป็นต้องเก็บสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ได้นาน 24 ชั่วโมง

กรณีที่ต้อเก็บยานี้เองให้ทำดังต่อไปนี้

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา มีลักษณะเป็นผงยาไลโอฟิลิซีสขาวถึงขาวนวล
- ยานี้มีตัวยาสำคัญ โวริโคนาโซล (voriconazole)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไฮดรอกซีโพรพิลเบตาเดกซ์ (hydroxypropylbetadex) โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) ไฮโดรคลอริกแอซิด (hydrochloric acid)

ผู้ผลิต บริษัท แอนฟาร์ม เฮลส์ เอสเอ ประเทศกรีซ

ผู้ตรวจปล่อยยา บริษัท ฟาร์มาเทน เอสเอ ประเทศกรีซ

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2565

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร