

เฟบบุโซสเสแท็บ

ความแรง 80 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

FEBUTON F.C. TABLETS 80 MG

(FEBUXOSTAT)

เฟบบุตอน เอฟ.ซี. แท็บเบลต 80 มก.

(เฟบบุโซสเสแท็บ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เฟบบุโซสเสแท็บ (Febuxostat) มีตัวยา 80 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มลดกรดยูริกในเลือดชนิดรับประทาน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อลดกรดยูริกในเลือดสูงชนิดเรื้อรัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคตับหรือโรคไต
- เป็นโรคไตรอยด์
- มีประวัติแพ้ยาอัลโลพูรินอล
- มีกรดยูริกในเลือดสูงจากโรคมะเร็ง
- เคยปลูกถ่ายอวัยวะ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ ชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาตามขนาดแพทย์สั่ง ไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดเอง
- ควรกินยาพร้อมอาหาร เพื่อลดอาการไม่สบายท้องอัน เกิดจากตัวยา

3.2 หากลืมกิน ยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ กินยาของมื้อต่อไป ตามเวลาปกติ โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ ผิดปกติที่ รุนแรง ให้หยุดใช้ยาและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำแพทย์หรือเภสัชกร ไม่ควรปรับขนาดยาเอง
- ท่านควรไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อ
 - ประเมินผลการรักษาด้วยการตรวจวัดกรดยูริก ในเลือด
 - ตรวจสอบอาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา
- ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
- แจ้งแพทย์และ/หรือเภสัชกรว่ากำลังใช้ยานี้ หากต้อง ผ่าตัด หรือเข้ารับการรักษาตัว เช่น ได้รับความเจ็บ ติดเชื้อรุนแรง มีไข้สูง ท้องเสียหรืออาเจียนอย่างมาก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย คลื่นไส้ ปวดศีรษะ
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยานี้นี้เป็นเม็ดเคลือบฟิล์มรูปยาวรี ปลายมนสี เหลืองอ่อนถึงเหลือง ด้านหนึ่งมีตัวเลข 980 อีกด้าน หนึ่งมีอักษร S D โดยมีเส้นแบ่งครึ่งระหว่าง S และ D
- ตัวยาสำคัญ เฟบบุโซสเสแท็บ 80 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, ไฮโปรมีโลส, คาร์บอกซิลเลต โซเดียม, แมกนีเซียม สเตียเรต, โอปราดราย เยลโล 03B82459

ผู้ผลิต

STANDARD CHEM. & PHARM. CO. LTD.

ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ยูเนี่ยนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**