

โซฟอสบูเวียร์

ความแรง 400 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า HEPASOF (เฮฟาซอพ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir)
- เป็นยาต้านไวรัสตับอักเสบซี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ชนิดเรื้อรัง โดยใช้ร่วมกับยาตัวอื่น ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับ** ยารักษาวัณโรค (เช่น ไรแฟมพิซิน, ไรฟาบูทีน, ไรฟาเพนทีน) ยารักษาอาการชัก (เช่น คาร์บามาเซพีน, เฟโนบาร์บิทัล, เฟนิโทอิน) และ เซนต์จอห์นเวิร์ต **เพราะอาจทำให้ยานี้ใช้ไม่ได้ผล**

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านเป็นโรคตับ โรคไต โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ให้แจ้งแพทย์
- หากท่านกำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะตั้งท้อง หรือให้นมลูก ให้แจ้งแพทย์
- หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ให้แจ้งแพทย์
- หากท่านกำลังใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชื่อ อะ-มิ-โอ-ดา-โรน, วิตามินเค ให้แจ้งแพทย์
- หากท่านกำลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรบางชนิด ให้แจ้งแพทย์

เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

“ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมภายใน 18 ชั่วโมง ให้กินทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมเกิน 18 ชั่วโมง ให้รอกินยามื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังกินยา ให้กินยาใหม่
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว นอนไม่หลับ หงุดหงิด ซึมเศร้า
- ท้องเสีย คลื่นไส้ ไม่อยากอาหาร
- คัน ผื่นที่ผิวหนัง
- อาการคล้ายไข้
- ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา ให้รอดูอาการ

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- หยิบยาออกจากขวดเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา เม็ดรูปยาวปลายมน นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร “GSF” อีกด้านหนึ่งเรียบ

ส่วนประกอบของยานี้ คือ แมนนิทอล, ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส, คีโรสคาร์เมลลอยด์โซเดียม, คอลลอยด์ลซิลิคอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, พอลิไวนิลแอลกอฮอล์, ไทเทเนียมไดออกไซด์, มาโครกอล 3350, ทาลก์

ผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2562