

วาลซาแทน
ความแรง 160 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Viotan (ไวโอแทน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าวาลซาแทน (valsartan) เป็นยาในกลุ่มยับยั้งแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติงเอนไซม์ (angiotensin-converting enzyme)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว และ ภาวะหลังจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังตั้งท้อง หรือคิดว่าตั้งท้อง หรือมีแผนจะตั้งท้อง
- โรคตับขั้นรุนแรง
- เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตและกำลังใช้ยาออลิสไคเรน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - โรคตับหรือไต
 - อยู่ระหว่างฟอกไตหรือได้เปลี่ยนถ่ายไตแล้ว
 - โรคหัวใจ
 - ต่อมหมวกไตทำงานมากผิดปกติ
 - เสียน้ำมากจากท้องเสีย อาเจียน กินยาขับปัสสาวะ
 - กินยาเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในเลือด
 - เคยแพ้ยาซึ่งมีอาการบวมที่หน้า ลิ้น และในลำคอ
 - อายุต่ำกว่า 18 ปี และกินยาลดความดันอื่นอยู่
 - กำลังให้นมลูก หรือมีแผนจะให้นมลูก
 - กินยาอื่นอยู่ เช่น ยากลุ่มยับยั้งแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติงเอนไซม์

“หากท่านไม่แน่ใจว่ามีอาการหรือกินยาโดยอยู่โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้
- กินยานี้ในเวลาเดียวกันทุกวัน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติเวียนศีรษะรุนแรง เป็นลม ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น และในลำคอ ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อ่อนเพลีย มึนงง ริงเวียนเมื่อเปลี่ยนท่า
- เวียนหัว บ้านหมุน หมดสติ
- กล้ามเนื้อเกร็ง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- แขนบวม ขาบวม
- ไอ ปวดหัว คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- แกะออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปยาวปลายมนนูนสี่เหลี่ยม ด้านหนึ่งมีอักษร “BL” และอีกด้านหนึ่งมีขีดคั่นระหว่างอักษร “V” และ “T”
- ตัวยาสําคัญ วาลซาแทน 160 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส, คอสโพรโตน, แมกนีเซียมสเตียเรต, คอลลอยด์ลซิลิคอนไดออกไซด์, ไฮโพรเมลโลสอี 5, ไฮโพรเมลโลสอี 15, โพลีเอทิลีนไกลคอล 6000, ไทเทเนียมไดออกไซด์, ทัลคัม, เรดโอเออร์นออกไซด์, เยลโลโอเออร์นออกไซด์ และน้ำ

ผู้ผลิต บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ธันวาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร