

ไมโคฟีโนเลตโมฟีติล
ความแรง 250, 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า MMF Symgens 250,500 mg
(เอ็มเอ็มเอฟ ซิมเจนส์ 250,500 มก.)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ไมโคฟีโนเลตโมฟีติล (mycophenolate mofetil) อยู่ในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต หรือหัวใจ
 - ใช้รักษาโรคไตอักเสบลูปัส ในผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - ⊗ กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูกหรือวางแผนจะตั้งท้อง หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ให้ตรวจการตั้งท้องก่อนใช้ยา
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากมีภาวะต่อไปนี้
 - มีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
 - มีรอยข้ำหรือเลือดออกอย่างไม่รู้สาเหตุ
 - ผู้ป่วยหญิงต้องตรวจการตั้งท้องก่อน เพราะยาอาจทำให้แท้งหรือทำให้เด็กพิการได้
 - รู้ว่ามีแผลหรือเลือดออกในทางเดินอาหาร
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่นยากดภูมิคุ้มกัน - ยาลดกรดหรือยาขับยั้งการหลังกรด - ยาต้านแบคทีเรียบางชนิด - ยาจับฟอสเฟต - โคลีสไทราซีน - ริแฟมพิซิน - โซซาลูโคนาโซล - เทลมิซาร์แทน

“ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามหักหรือแบ่งยา
- 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร**
- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งที่ได้รับบริการว่ากำลังใช้ยานี้อยู่
- ห้ามหยุดยาเอง ให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ก่อนฉีดวัคซีนให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ เพราะยานี้อาจลดประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดเชื้อเป็น
- งดการบริจากรเลือดในระหว่างใช้ยานี้ และงดต่อไปอีก 6 สัปดาห์หลังหยุดยา
- ต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ เพราะยานี้ทำให้เกิดอันตรายต่อทารก และเมื่อรู้ตัวตั้งท้องต้องรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที
- ผู้ป่วยชายและคู่่นอนควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้และอีก 90 วันหลังจากหยุดยา
- ไม่บริจาคอสุจิขณะใช้ยานี้และอีก 90 วันหลังจากหยุดยา
- หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยสวมใส่เสื้อผ้า และทาครีมกันแดด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - มีอาการของโรคติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
 - มีรอยข้ำหรือเลือดออกอย่างไม่รู้สาเหตุ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- อาเจียน วิดกกังวล นอนไม่หลับ เวียนหัว ปวดหัว หัวใจเต้นเร็ว ท้องเสีย ท้องผูก อาหารไม่ย่อย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา**
เอ็มเอ็มเอฟ ซิมเจนส์ 250 มก. : ยาเม็ดรูปยาว ปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีม่วง
เอ็มเอ็มเอฟ ซิมเจนส์ 500 มก. : ยาเม็ดรูปยาว ปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีม่วง
- ตัวยาสําคัญ** ไมโคฟีโนเลต โมฟีติล
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Cellulose microcrystalline (เซลลูลูโลส ไมโครคริสเตอลีน), Croscarmellose sodium (คลอสคาเมลโลส โซเดียม), Povidone (โพรโโดน), Magnesium stearate (แมกนีเซียม สเตเรียเรท)
- ผู้ผลิต** บริษัท โคซาก ฟาร์มา ไอแอล วี คิมยา ชานายี จำกัด ประเทศตุรกี
- ผู้นำเข้า** บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- ผู้แทนจำหน่าย** บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** กรกฎาคม 2567
- ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ** **อย.**
▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร