

**อะทาวาสแตติน**  
**ความแรง 10, 20, 40, 80 มิลลิกรัม**  
**ชนิด เม็ดเคลือบพิล์ม**  
**ชื่อการค้า CHLOVAS-ZIS 10, 20, 40, 80**  
**(คลาวาส-ซิส 10, 20, 40, 80)**

## 1. ยานี้คือยาอะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อะทาวาสแตติน (atorvastatin) มีตัวยา 10, 20, 40 หรือ 80 มิลลิกรัม เป็นยาลดไขมันในเลือด

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร เพื่อ

- ช่วยลดไขมันในเลือด
- ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรค หลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ◎ เดยแพ้ยาซึ่ง หรือส่วนประกอบของยาซึ่ง
- ◎ เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- ◎ ผู้ป่วยที่มีอาการโรคตับกำเริบ
- ◎ ผู้ที่กำลังใช้ยา抗凝ซีอิ๊วาร์โคโนไซล์ เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงต่อกล้ามเนื้อและไตรายเฉียบพลัน แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ดีจอกซิน สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาซึ่งวันละครั้ง เวลาใดก็ได้โดยให้เป็นเวลา ใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอ กินก่อนหรือหลังอาหาร ก็ได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยาซึ่งเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

### 4.1 ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- กินยาซึ่งอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษาและอันตรายจากยา

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก
- หน้ามีด เป็นลม แน่นหน้าอกร หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำดามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- เกิดอาการพิษต่อกล้ามเนื้อ คือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น่อง หลังหรือตามตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง กดเจ็บ ตะคริวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็งหรือแข็งเกร็ง ปัสสาวะสีเข้ม หรือสีน้ำตาล ถ่ายปัสสาวะลำบากหรือ ปัสสาวะออกน้อยลง
- เบื้องอาหาร คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ปวดท้องรุนแรง อ่อนเพลียรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง อุจจาระสีซีด ปัสสาวะสีเข้มหรือสีน้ำตาล
- อาการอ่อนแรง เปลี้ยง อัมพาตซึ่งได้ซึ่กหนึ่งของร่างกาย
- หายใจลำบาก ไอแห้ง น้ำหนักลด อ่อนล้าและมีไข้ “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ

รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- หลงลืม ความจำบกพร่อง นอนไม่หลับ ฝันร้าย สับสน “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา”  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแพลงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงแดดตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีขาว มี 4 ความแรง ดังนี้
  - อะทาวาสแตติน ความแรง 10, 20 มิลลิกรัม ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
  - อะทาวาสแตติน ความแรง 40 มิลลิกรัม ด้านหนึ่งมีอักษร CZ และ 40 อยู่ระหว่างขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
  - อะทาวาสแตติน ความแรง 80 มิลลิกรัม ด้านหนึ่งมีขีดกลางนาท อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ตัวยาสำคัญ อะทาวาสแตติน
- ส่วนประกอบอื่นๆ  
ส่วนประกอบของเม็ดยา ได้แก่ แอลกออลโซโนโนไซเดต, วิตามินอี 50%, อีดีเตท้าไซเดียม, โลว์-สับสติติวิทเตท ไซด์ออกซิโพรวิชูลูลส, โซเดียมอลิวิวชูลฟต, โซเดียม คาร์บอเนต, เพียริฟายวอเตอร์\*, ครอสคามิลูลโซไซเดียม, โซเดียมสตราราซิกโคลเลต, ไมโครคริสตัลลีนเซลลูลูลส, คอลลอยด์ดอลชิลิกอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตรต โซนประกอบของสารเคลือบฟิล์ม “ไดแก่ โวปารา® เอเอ็ม บี 2 ไวนท์, เพียริฟายวอเตอร์\*

\*ระยะออกไบโ INA ระหว่างกระบวนการผลิต

ผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมต บีเอฟເອສ ຈຳກັດ ປະເທດໄທ  
ເອກສານນັບປັບປຸງຄົງລໍາສຸດເມື່ອ 18 ກຣກວຸດ

## ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

### **คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข**

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยาแล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่อง หลัง หรือตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
4. ควรตรวจการทำงานของตับก่อนได้รับยาและหลังได้รับยา 6 และ 12 สัปดาห์ ผู้ที่ได้รับยาแล้วเป็นประจำตรวจทุก 6 เดือน หรือตามค่าแนะนำของแพทย์ หากระดับ transaminase สูงกว่า upper normal limit 3 เท่า ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
5. ระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกับยา digoxin, warfarin เป็นจากระดับยาเหล่านี้ในเลือดอาจสูงจนเกิดอันตรายได้
6. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ (myopathy) หรือภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) จะเพิ่มขึ้นเมื่อให้ยากลุ่มนี้กับยาอื่นๆ เช่น azole antifungals เช่น ketoconazole, itraconazole เป็นต้น ยากลุ่ม macrolides เช่น erythromycin, clarithromycin เป็นต้น ยากลุ่ม HIV protease inhibitors เช่น indinavir, ritonavir, nelfinavir, saquinavir เป็นต้น ยา verapamil, ยา diltiazem, ยา gemfibrozil, ยา nicotinic acid, ยา cyclosporine, ยา amiodarone เป็นต้น
7. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) จะเพิ่มขึ้นในภาวะเหล่านี้ เช่น การใช้ยาขนาดสูง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทำงานของตับ หรือไตน์พาร์อง ผู้ที่ติดสารเรื้อรัง ภาวะพร่องไทรอยด์ซอร์โนน (hypothyroidism) เป็นต้น
8. ระมัดระวังการใช้ยาที่ร่วมกับ colchicine โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีการทำงานของไตน์พาร์อง เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ (myopathy) หรือภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis)
9. การใช้ยาแล้วอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้

**ข้อมูลยาที่เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร