

1.3. Rocaine 7.5 mg/ml
โรปิวาเคนไฮโดรคลอไรด์
ความแรง 7.5 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า ROCAINE Injection 7.5 mg/ml
(โรปิเวน อินเจกชัน 7.5 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โรปิวาเคนไฮโดรคลอไรด์ (ropivacaine) เป็นยาชาเฉพาะที่

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้สั่งใช้โดยแพทย์ สำหรับทำให้ชาเพื่อการผ่าตัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยได้รับแจ้งว่ามีปริมาณของเหลวในเลือดน้อย
- ฉีดเข้าหลอดเลือด
- ฉีดเข้ามดลูกเพื่อบรรเทาปวดในระหว่างคลอด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ตับ หรือไต
- เป็นโรคเลือด เรียกว่า พอไฟเรีย (porphyria)
- เป็นเด็กแรกคลอด หรืออายุน้อยกว่า 12 ปี
- ตั้งท้อง หรือกำลังให้นมลูก
- กำลังใช้สมุนไพรหรือยาต่อไปนี้ ยาต้านซึมเศร้า
 - ยาฆ่าเชื้อรา เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาได้

**“หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะเหล่านี้
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน
- ### 3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดแล้วมีอาการ เช่น มึนงง ลึนชา ปากชา ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ ทำงานกับเครื่องจักร หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ อาจทำให้หงวงซึม
- ถ้าต้องหยุดใช้ยาอย่างฉับพลันให้ปรึกษาแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ชัก
- รู้สึกมึนงง เวียนหัว ปวดหัว คลื่นไส้

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- รู้สึกชาคล้ายเข็มทิ่ม
- หัวใจเต้นเร็ว หรือช้าผิดปกติ
- ปวดท้ายทอย
- รู้สึกตัวร้อน หรือหนาวสั่น
- ปวดหลัง

**“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาน้ำปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด สี ไม่มีสี
- ตัวยาสำคัญ โรปิวาเคนไฮโดรคลอไรด์ 7.5 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก, และน้ำ สำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต

รียอน ฟาร์มาซูติคอล สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไตวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดี
รังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ตุลาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>