

เซเวลามเมอร์
ความแรง 800 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Sevela F.C. Tablet 800 mg
(เซเวล่า เอฟ. ซี. แท็บเล็ต 800 มิลลิกรัม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เซเวลามเมอร์คาร์บอเนต (sevelamer carbonate) เป็นยาในกลุ่มจับฟอสเฟต

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อควบคุมระดับฟอสเฟตในเลือด สำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรัง ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นของยา
- แพทย์แจ้งว่ามีฟอสเฟตในเลือดต่ำ
- ลำไส้อุดตัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีการกลืนผิดปกติ
 - ลำไส้เคลื่อนไหวผิดปกติรุนแรง
 - กำลังเป็นลำไส้อักเสบ
 - เคยผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือลำไส้
 - มีความผิดปกติในการดูดซึมวิตามินหรือโฟเลต
 - กำลังปวดท้อง ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้
 - มีภาวะขาดสารโมโนไทรอยด์
 - มีภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกิน
 - ผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า 6 ปี
 - กำลังตั้งท้องหรือวางแผนจะตั้งท้อง
 - กำลังให้นมลูก
 - กำลังกินยาชนิดอื่นๆ อยู่ เพราะยานี้จะทำให้ประสิทธิภาพของยาอื่นๆ ลดลง
- "หากมีภาวะดังกล่าวให้แจ้งแพทย์"

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหาร ห้ามกินตอนท้องว่าง
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว ห้ามหัก ห้ามบดเม็ดยา

3.2 หากท่านลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา ให้ข้ามมื้อที่ลืม แล้วรอกินยาของมื้อถัดไปตามปกติ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ห้ามหยุดใช้ยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่เกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ท้องอืดมากผิดปกติ ท้องบวมหรือเป็นตะคริว ท้องผูกรุนแรง
- ปวดท้องรุนแรง ร่วมกับมีไข้หนาวสั่น
- ถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายดำ

"ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที"

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องช่วงบน ท้องผูก
- ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ปวดท้อง

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
 แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาวถึงสีขาวออกสีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "CH86" อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ตัวยาสำคัญ** เซเวลามเมอร์คาร์บอเนต
- ส่วนประกอบอื่น ๆ**
 - เม็ดแกน ประกอบด้วย ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, โซเดียมคลอไรด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, ซิลิกอนไดออกไซด์ และน้ำกลั่น
 - ฟิล์มเคลือบ ประกอบด้วย ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส, ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส, กรดสเตียริก และโพลีเอทิลีนไกลคอล

ผู้ผลิต Chen Ho Pharmaceutical Co., Ltd, ประเทศไต้หวัน

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 สิงหาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<https://ndi.fda.moph.go.th/>