

ยามีเดเคลิบพิลัม
สูตรเลดีพาสเวียร์ 90 มิลลิกรัมผสมกับ
โซฟอสบูเวียร์ 400 มิลลิกรัม
ชื่อการค้า : ฮาโรนิ (Harvoni®)

1. ยานี้คือยาอะไร

- ### 1.1 ยานี้มีข้อห้ามยากล่าวอะไรบ้าง
- ยานี้มีข้อห้ามยากล่าวว่า เลดีพาสเวียร์ (ledipasvir) และโซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir) เป็นยาด้านไวรัส
- ### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
- ใช้รักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สายพันธุ์ 1, 3, 4, 5 หรือ 6 ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังในการใช้ยา

- ### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่
- ห้ามใช้เมื่อแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้
 - ห้ามใช้เมื่อกำลังรักษาด้วยยารักษาวัณโรคที่มีชื่อสามัญว่า ไรแฟมปีซิน (rifampicin) หรือ ไรฟาบูติน (rifabutin) เพราะทำให้ยานี้ใช้ไม่ได้ผล
 - ห้ามใช้เมื่อกำลังรักษาด้วยยากันชักหรือยาโรคลมชักที่มีชื่อสามัญว่า คาร์บามาซีพีน (carbamazepine) ฟีนโทอิน (phenytoin) หรือฟีนโทอิน (phenytoin) เพราะทำให้ยานี้ใช้ไม่ได้ผล
 - ห้ามใช้ยานี้เมื่อกำลังรักษาด้วยยาลดไขมันในเลือดที่มีชื่อสามัญว่า โรซิววา สแตติน เพราะอาจไม่ปลอดภัย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านเป็นโรคไต โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคติดเชื้อเอชไอวี
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ไม่ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
- เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งว่ากำลังใช้ยา หรือ **แอลกอฮอล์** ในขณะที่กำลังใช้ยานี้ หรือ **สมุนไพร** ใดๆ ในขณะกำลังใช้ยานี้ อาจส่งผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายอื่น ๆ ได้
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาลดกรด ยารักษาแผลในกระเพาะ หรือใส่ยาใส่หู หรือยาบรรเทาอาการเสบท้อง อาหารไม่ย่อย เพราะอาจทำให้การรักษาด้วยยานี้ไม่ได้ผล
- แจ้งแพทย์หากท่านเคยใช้ยา หรือกำลังใช้ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะมิโอดาโรน หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน

3. วิธีใช้ยา

- ### 3.1 ขนาดและวิธีใช้
- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กินยา 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 - ให้กลืนยาทั้งเม็ด **ห้าม** เคี้ยว บด หรือ หักเม็ดยา เนื่องจากยา มีรสขมมาก
 - หากกินยาเกิน 4 ชั่วโมง ต้อง **กินห่างจากยา** อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 - หากจะกินยาที่ยังมีการหลังกรดในกระเพาะ เช่น โอเมพราโซล ให้กินพร้อม กับ ยานี้ **ห้ามกินก่อนยานี้**

- ### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร
- ให้กินทันทีที่นึกได้ **แต่ถ้าลืมเกิน 18 ชั่วโมง ให้รอ กินยามาครั้งต่อไป** ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

- ### 3.3 หากกินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร
- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที พร้อมนำยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หากมีอาการผิดปกติใน 5 ชั่วโมงหลังกินยา ให้กินยาใหม่
- ระมัดระวังการขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- ### 5.1 อันตรายที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- บวมที่ใบหน้า เมล็ดตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
 - มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
- แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
 - ปวดหัว รู้สึกอ่อนเพลีย เป็นผื่น

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา : ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายมน สีขาว
ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "GSI" อีกด้านหนึ่ง มีตัวอักษร
"7985"

ส่วนประกอบของยา :

ตัวยาออกฤทธิ์ : เลดีฟาสเวียร์ และ โซฟอสบูเวียร์
ส่วนประกอบอื่น : คอลลอยด์ล ซิลิกอน ไดออกไซด์
โคโพวโตน ครัวออสคาร์เมลโลส แลคโตส
แมกนีเซียมสเตียเรต ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส
โพลเอทิลีน ไกลคอล โพลไวนิลแอลกอฮอล์ ทัลค
ไททาเนียมไดออกไซด์

ผู้ผลิต Patheon Inc., Canada
ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย DCH (Auriga) Thailand
Limited

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**