

เดกเตรน 70, ไฮโพรเมลโลส
ความแรง 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร,
3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับหยอดตา
ชื่อการค้า TRANCELTEAR
(ทรานเซลเทียร์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

• ยานี้มีชื่อว่าเดกเตรน 70 (dextran 70) มีตัวยา 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ ไฮโพรเมลโลส (hypromellose) มีตัวยา 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันบูด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการตาแห้ง และรักษาอาการระคายเคืองตา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - อยู่ในระยะให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาหยอดตาอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียว เมื่อใช้แล้วต้องทิ้ง ไม่จำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ออก
- วิธีใช้ยา
 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตา
 2. ตรวจสอบสภาพของยาก่อนใช้

- o อย่าใช้ยานี้ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 - o อย่าใช้ยานี้ถ้ามีน้ำยา มีสี หรือขุ่น
3. หักปลายหลอดเพื่อเปิดใช้
 4. เมื่อเปิดแล้วให้หยอดยาทันทีเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 5. ระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับดวงตาหรือสิ่งอื่น
 6. หยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1-2 หยด ตามที่ต้องการ

3.2 หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการ ให้หยอดยาทันทีที่นึกขึ้นได้หรือตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ล้างตาด้วยน้ำอุ่น

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- งดการขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา จนกว่าสายตาจะกลับมามองเห็นได้ปกติ **เพราะยานี้ อาจทำให้ตาพร่ามัวชั่วคราว**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากใช้ยาแล้วอาการตาแห้งไม่ดีขึ้นหรืออาการแฉะลง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
- ปวดหัว กลัวแสง ความรู้สึกที่ตาลดลง เส้นเลือดที่เยื่อตาบวม

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ตาแห้ง ระคายเคืองตา คันตา รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในตา
- มีขี้ตา น้ำตาไหลมาก มองเห็นภาพไม่ชัด

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง
- เปิดใช้เกิน 12 ชั่วโมงแล้วใช้ไม่หมดให้ทิ้ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะของยา** หลอดพลาสติกละ 0.3 มิลลิลิตร ภายในบรรจุยาปราศจากเชื้อ ใส่ ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** เดกเตรน 70 และ ไฮโพรเมลโลส
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, โซเดียมคลอไรด์, โพแทสเซียมคลอไรด์, แมกนีเซียมคลอไรด์, แคลเซียมคลอไรด์, สารละลายกรดไฮโดรคลอริก, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท มิลลิเมต บีเอฟเอส จำกัด
179 หมู่ที่ 8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย 57210
Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

• <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

• <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร