

## แคริพราซีน

ขนาด 1.5, 3, 4.5 หรือ 6 มิลลิกรัม

รูปแบบแคปซูล

[รีกิล่า]

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าแคริพราซีน (cariprazine) เป็นยา  
รักษาโรคจิตเวช

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคจิตเวชในผู้ใหญ่

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับ
  - ยาฆ่าเชื้อรา แบคทีเรียและไวรัสบางชนิด
  - ยารักษาวัณโรคและโรคเอดส์บางชนิด
  - ยารักษาโรคลมชักและความดันโลหิตสูงบางชนิด
  - สมุนไพรหรืออาหารเสริมบางชนิด

หากท่านจำเป็นต้องกินยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมดังกล่าว ต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้:

- หญิงมีครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควร  
เลี่ยงการใช้ยานี้ ทั้งนี้แพทย์จะพิจารณาตามความ  
เหมาะสมอีกครั้ง
- แจ้งแพทย์หากท่านมีโรคประจำตัวต่อไปนี้
  - โรคสมองเสื่อม
  - โรคพาร์กินสัน
  - โรคเบาหวาน
  - โรคหลอดเลือดสมองหรือลิ้มเลือดอุดตัน
  - โรคลมชัก
  - โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำ หรือเป็นโรค  
เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ หัวใจเต้นผิด  
จังหวะ
  - โรคไตหรือโรคตับขั้นรุนแรง

- แจ้งแพทย์ทุกครั้งหากท่านกินยาต่อไปนี้
  - ยารักษาโรคหัวใจที่มีไดจอกซิน (Digoxin)  
เป็นส่วนประกอบ
  - ยาด้านการแข็งตัวของเลือดที่มีดาบิกาทราน  
(Dabigatran) เป็นส่วนประกอบ

“แจ้งแพทย์ เพื่อปรับขนาดยาและวิธีการรักษาที่  
เหมาะสมกับท่าน”

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของ แพทย์หรือเภสัชกร

- ยานี้เป็นรูปแบบยารับประทาน แพทย์จะพิจารณา  
ขนาดยาให้แก่ท่านโดยพิจารณาจากชนิดและ  
ความรุนแรงของโรค

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไป ให้  
รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- ถ้าลืมกินยาดังแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ให้ไปพบแพทย์ทันที

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ  
รุนแรง เช่น เวียนศีรษะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ให้ไป  
โรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยาตรงเวลาทุกวันตามแพทย์สั่ง
- งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะที่กินยานี้
- ยานี้อาจทำให้ง่วง ดังนั้นเลี่ยงขับรถ หรือทำงานกับ  
เครื่องจักร
- หญิงที่กำลังกินยานี้ ต้องคุมกำเนิดและต้องคุมกำเนิด  
ต่อไปอีกอย่างน้อย 10 สัปดาห์ หลังจากหยุดกินยานี้

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ ได้แก่ ลมพิษ บวมที่ใบหน้า  
เปลือกตาริมฝีปาก หรือลิ้น หน้ามืด เป็นลม แน่น  
หน้าอก หายใจลำบากผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุด  
ลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
  - มีไข้ร่วมกับ มีเหงื่อออก กล้ามเนื้อเกร็ง และง่วงนอน
  - กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้อโดยไม่มีสาเหตุ
  - มีความคิด หรือพฤติกรรมฆ่าตัวตาย
- “หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะต้องได้รับ  
การรักษาเร่งด่วน”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- กระสับกระส่าย นิ่งนิ่งๆไม่ได้ มือสั่น หรือขาสั่นขณะนั่งอยู่เฉยๆ
  - น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
  - หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
  - มองไม่ชัด หรือการมองเห็นผิดปกติ
- “ไม่ต้องหยุดยา แต่ถ้าหากมีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์  
ทันที”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในอุณหภูมิห้อง ในที่แห้ง และไม่โดนแสงแดด
- เก็บยานี้ให้พ้นมือและสายตาเด็ก
- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะและสีของยา
  - ยาขนาด 1.5 มิลลิกรัม  
มีตัวอักษร “GR 1.5” บนแคปซูลสีขาว
  - ยาขนาด 3 มิลลิกรัม  
มีตัวอักษร “GR 3” บนแคปซูลสีเขียวด้านหนึ่ง และสี  
ขาวอีกด้านหนึ่ง
  - ยาขนาด 4.5 มิลลิกรัม  
มีตัวอักษร “GR 4.5” บนแคปซูลสีเขียว
  - ยาขนาด 6 มิลลิกรัม  
มีตัวอักษร “GR 6” บนแคปซูลสีม่วงด้านหนึ่ง และ  
สีขาวอีกด้านหนึ่ง
- ส่วนประกอบของยานี้ได้แก่  
แคริพราซีน ไฮโดรคลอไรด์ แป้งข้าวโพด  
แมกนีเซียมสเตียเรท

ผู้ผลิต:

Gedeon Richter Plc.

เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ผู้นำเข้า :

บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด  
กรุงเทพฯ ประเทศไทย โทร 02-168-8671

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร