

เซเวลามาเมอร์
ความแรง 800 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Kavolred (คาโวลดเรด)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

• ยานี้มีชื่อว่า เซเวลามาเมอร์คาร์บอเนต (sevelamer carbonate) เป็นยาในกลุ่มจับฟอสเฟต

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

• ยานี้ใช้เพื่อควบคุมระดับฟอสเฟตในเลือด สำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรัง ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นของยา
- X** แพทย์แจ้งว่ามีฟอสเฟตในเลือดต่ำ
- X** ล่าไส้อุดตัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้แจ้งแพทย์ ถ้าท่านมีภาวะดังต่อไปนี้
 - มีการกลืนผิดปกติ
 - ล่าไส้เคลื่อนไหวผิดปกติรุนแรง
 - กำลังเป็นล่าไส้อักเสบ
 - เคยผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือล่าไส้
 - มีความผิดปกติในการดูดซึมวิตามินหรือโฟเลต
 - กำลังปวดท้อง ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้
 - มีภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์
 - มีภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกิน
 - ผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า 6 ปี
 - กำลังตั้งท้องหรือวางแผนจะตั้งท้อง
 - กำลังให้นมลูก
 - กำลังกินยาชนิดอื่นๆ อยู่ เพราะยานี้จะทำให้ประสิทธิภาพของยาอื่นๆ ลดลง

“หากมีภาวะดังกล่าวให้แจ้งแพทย์”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหาร ห้ามกินตอนท้องว่าง
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว ห้ามหัก ห้ามบดเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา ให้ข้ามมื้อที่ลืม แล้วรอกินยาของมื้อถัดไปตามปกติ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดใช้ยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องอืดมากผิดปกติ ท้องบวมหรือเป็นตะคริว
- ท้องผูกรุนแรง
- ปวดท้องรุนแรง ร่วมกับมีไข้หนาวสั่น
- ถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายดำ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5.2 อาการที่ยังไม่ต้องรีบไปพบแพทย์ เช่น

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องช่วงบน ท้องผูก
 - ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ปวดท้อง
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาวถึงขาวนวล รูปกลมรี พิมพ์ “R789” ไว้บนเม็ดยาด้านหนึ่ง
- **ตัวยาสําคัญ** เซเวลามาเมอร์คาร์บอเนต
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่**
 - ส่วนประกอบในเม็ดแกนประกอบด้วย แมนนิทอล, ครอสโพลิไวดอน ชนิดบี, ไฮดร็อกซีโพรพิลเซลลูโลส, คอลลอยดอลซิลิโคนไดออกไซด์, ซิงค์สเตียเรต,
 - ฟิล์มที่เคลือบประกอบด้วย โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ทัลก์, เลซิทีน, แชนแทนกัม
 - หมึกที่ใช้พิมพ์ประกอบด้วย เซลแล็ก, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, ไอโรออนออกไซด์แบล็ก, เอ็นบีวีทิลแอลกอฮอล์, โพรพิลีนไกลคอล, แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

ผู้ผลิต บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดีส์ แลบบอราทอรีส์, เอฟทีโอ-เอสอีแซด, รัฐอานธรประเทศ, อินเดีย

ผู้นำเข้า บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดีส์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย บริษัทซิลลิด ฟาร์มา จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 สิงหาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>