

ไบรโมนิติน ทาเทรต 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ชนิดยาหยอดตา ชื่อการค้า Brizagan (ไบรซาแกน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไบรโมนิติน ทาเทรต มีตัวยา 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อลดความดันในลูกตาสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดหรือมีความดันในลูกตาสุง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ทารกหรือเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
- ⊗ ใช้ยากลุ่ม MAO inhibitor และยาต้านซึมเศร้าบางชนิด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - เคยหรือมีอาการเหล่านี้: ซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยที่เลือดไปเลี้ยงสมองและส่วนต่างๆของร่างกายลดลง ผู้ที่มีความดันโลหิตผิดปกติ
 - มีความผิดปกติของตับหรือไต
 - ผู้ที่ใช้ยาดังต่อไปนี้: ยาแก้ปวด ยาระงับประสาท ยาแก้ชัก ยารักษาโรคหัวใจหรือยาลดความดันโลหิต
 - ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 - ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

- เด็กอายุ 2-7 ปีหรือน้ำหนักน้อยกว่า 20 กิโลกรัม
- ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ดวงตา ปวดหรือระคายเคืองตา
- ผู้ที่มีอาการตาแห้ง ระคายเคืองตา จากสารกันเสีย เบนซาลโคเนียมคลอไรด์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาทั่วไปคือ 1 หยด หยอดเข้าตาข้างที่เป็น วันละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมง
- วิธีใช้ยาหยอดตา
 1. ล้างมือให้สะอาด
 2. ตรวจสอบสภาพของยาก่อนใช้
 - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีสีหรือขุ่น
 - อย่าใช้ยานี้หากภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 3. นอนหงายหรือเงยหน้าขึ้น แล้วหยอดตาข้างที่มีอาการ ครั้งละ 1 หยด
 4. ขณะใช้ยาหยอดตา ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้บริเวณปลายหลอดสัมผัสกับดวงตา ขนตา มือหรือสิ่งอื่นๆ
 5. หากใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาชนิดอื่นร่วมด้วย ควรเว้นให้ห่างกันอย่างน้อย 5-15 นาที

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หากลืมหยอดยา ให้หยอดยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้จะถึงเวลาที่จะหยอดยาครั้งต่อไป ให้รอหยอดยาครั้งต่อไป

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ให้พบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสดวงตาหรือสิ่งอื่นใด
- หากเปิดใช้แล้วมากกว่า 28 วัน ไม่ควรใช้ยานี้ต่อ
- ไม่ควรใช้ยานี้หากภาชนะบรรจุฉีกขาด หัก ก่อนเปิดใช้
- เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์เนื่องจากยาอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือส่งผลต่อการมองเห็น
- ควรถอดคอนแทคเลนส์ก่อนใช้ยาและใส่กลับหลังใช้ยา 15 นาที เพื่อป้องกันคอนแทคเลนส์เปลี่ยนสี

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - เยื่อตาอักเสบ กระจุกตาผิดปกติ การมองเห็นผิดปกติ
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ตาแดง ปวดตา ระคายเคืองตา ตาแห้ง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** สารละลายสีใสหรือเขียว-เหลืองอ่อน บรรจุในขวดพลาสติกสีขาวหรืออมเหลือง
- **ตัวยาสำคัญ:** ไบรโมนิตินทาเทรต 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่** เบนซาลโคเนียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ โซเดียมซिटเรตไดไฮเดรต ซिटริกแอซิดโมโนไฮเดรต โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรคลอริกแอซิด นำสำหรับยาปราศจากเชื้อ

ผู้ผลิต RAFARM SA

Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka 19002,

Paiania Attiki Greece

ผู้นำเข้า Mega Lifesciences Public Company Limited
Samutprakarn, Thailand

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2565

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**