

พรีกาบาลิน
ความแรง 75 และ 150 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล

ชื่อการค้า Pregabalin GPO (พรีกาบาลิน จีพีโอ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พรีกาบาลิน (pregabalin) มีตัวยา 75 และ 150 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยากันชัก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท โรคลมชัก โรควิดกั๊งวอลทั่วไป และโรคปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ห้ามใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้หญิงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
 - หากท่านเป็นโรคหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติโรคหัวใจ โรคตับ และโรคไต
 - ผู้บางรายที่เป็นเบาหวาน อาจมีน้ำหนักขึ้นระหว่างใช้ยานี้ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อปรับขนาดยาเบาหวาน
 - ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ ยาอื่น ๆ เช่น ออกซีโคโดน, ยาที่มีผลกดระบบประสาท เช่น ลอราซีแพม เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ทั้งแคปซูล (ห้ามแกะแคปซูล) กินพร้อมหรือไม่พร้อมกับการกินก็ได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีพร้อมนำกล่องยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยานี้อาจทำให้ง่วงซึม
- อย่าหยุดยาเอง และให้กินยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีความคิดฆ่าตัวตาย

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มึนงง ง่วงนอน ปวดหัว
- รู้สึกอารมณ์ดี สับสน หงุดหงิด หลงลืม ทรงตัวไม่ได้ การเดินผิดปกติ นอนไม่หลับ ซึมเศร้า
- จมูกและคอหอยอักเสบ
- อยากอาหารเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น แขน-ขาบวม
- มองเห็นผิดปกติ เห็นภาพซ้อน มีอาการบ้านหมุน
- ปากแห้ง ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเสีย
- ตะคริว ปวดข้อ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดแขน-ขา
- ความรู้สึกและกิจกรรมทางเพศไม่ปกติ
- บวม เมื่อย ทำเดินผิดปกติ หกล้ม มีความรู้สึกคล้ายคนเมา

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับพรีกาบาลิน จีพีโอ (75 มิลลิกรัม) แคปซูลสีแดงและสีขาว มีอักษร “PGN” สีดำ และมีตัวเลข “75” สีดำ ภายในมีตัวยาพรีกาบาลิน 75 มิลลิกรัม

พรีกาบาลิน จีพีโอ (150 มิลลิกรัม) แคปซูลสีขาว มีอักษร “PGN” สีดำ และมีตัวเลข “150” สีดำ ภายในมีตัวยาพรีกาบาลิน 150 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบในตำรับ

แป้งพรีเจลาตินในซ์, แป้งข้าวโพด, ทาลคัม

ผู้ผลิต : องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 03 ธันวาคม 2562