

# แผงแห่งของเชื้อยีสต์ แซคคาโรมายเซส เซอริวิสเซีย (บัวลาดิอิ) 250 มิลลิกรัม ชนิดยาผงสำหรับรับประทาน ชื่อการค้า NORMAGUT SACHETS (นอร์มากัท ชนิดซอง)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่านอร์มากัท ชนิดซอง (Normagut Sachets) มีตัวยาคือ แผงแห่งของเชื้อยีสต์แซคคาโรมายเซส บัวลาดิอิ (แซคคาโรมายเซส เซอริวิสเซีย (บัวลาดิอิ)) 282.5 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ แซคคาโรมายเซส เซอริวิสเซีย (บัวลาดิอิ) 250 มิลลิกรัม (ให้จุลินทรีย์มีชีวิต 2,500 ล้านเซลล์) เป็นยาในกลุ่มจุลินทรีย์รักษาอาการท้องเสีย

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ให้ทำงานได้ปกติ
- ใช้รักษาเพื่อลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการท้องเสียเฉียบพลัน
- ป้องกันอาการท้องเสียระหว่างเดินทาง
- ป้องกันอาการท้องเสียจากการกินยาปฏิชีวนะ
- ลดอาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคทีเรีย (H. pylori) เช่นอาการท้องเสีย

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ผู้ที่แพ้ต่อเชื้อยีสต์ หรือส่วนประกอบใด ๆ ในผลิตภัณฑ์
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
  - ผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  - ผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในแผนกผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) และมีสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางโดยมีไซท์ที่ไม่ทราบสาเหตุ

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- มีอาการท้องเสียนานกว่า 2 วันจากการใช้ยา

“หากมีภาวะดังกล่าว ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ขวบ ขึ้นไป: กินครั้งละ 1 ซอง วันละ 1 – 2 ครั้ง
- เด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ: ควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์
- วิธีใช้ยา: เทผงผลิตภัณฑ์ในซอง ลงในน้ำหรือเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณเล็กน้อย จากนั้นผสมและดื่ม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สามารถผสมกับอาหารได้ ไม่ควรเทหรือผสมกับของเหลวหรืออาหารที่เย็นจัด หรือร้อนจัด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้มื้อถัดไปให้รอกินตามปกติ **ไม่ต้อง** กินเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

ไม่มีข้อมูล

## 5. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดใช้แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดใช้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบ

- **ลักษณะยา:** ผงยาสีขาวถึงน้ำตาลอ่อน รสผลไม้ ซึ่งบรรจุของอลูมิเนียม ซองละ 0.765 กรัม แล้วบรรจุในกล่องกระดาษกล่องละ 10 และ 30 ซอง
- **สารสำคัญ:** 1 ซองประกอบด้วย แผงแห่งของเชื้อยีสต์แซคคาโรมายเซส บัวลาดิอิ (แซคคาโรมายเซส เซอริวิสเซีย (บัวลาดิอิ)) 282.5 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ แซคคาโรมายเซส เซอริวิสเซีย (บัวลาดิอิ) 250 มิลลิกรัม (ให้จุลินทรีย์มีชีวิต 2,500 ล้านเซลล์)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่** แลคโตส ฟรุกโตส ซิลิกา คอลลอยด์อล แอนไฮดรัส สารแต่งกลิ่นและรสผลไม้

ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2566

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**