

โมเมทาโซนฟูโรเอต

ความแรง 50 ไมโครกรัม ต่อ 1 สูด
ชนิดพ่นจมูก

ชื่อการค้า **MONASAL® NASAL
SPRAY** (โมนาซอล นาซอล สเปรย์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โม-เม-ทา-โซน-ฟู-โร-เอต (mometasone furoate) เป็นยาในกลุ่มสเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาอาการคัดจมูกที่เกิดจากภูมิแพ้ในผู้ใหญ่ และเด็กที่อายุมากกว่า 3 ปี
- รักษาริดสีดวงจมูกในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะการติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา
- อยู่ในช่วงการพักหลังผ่าตัดจมูกหรือจมูกได้รับบาดเจ็บ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ
 - โรควัณโรค
 - โรคติดเชื้อ
 - โรคเป็นถุงผนัง
 - ใช้ยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์
 - มีอาการระคายเคืองจมูกหรือลำคอ
 - ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- เด็กอายุมากกว่า 12 ปี และผู้ใหญ่ ใช้ข้างละ 2 สูด วันละ 1 ครั้งหรือตามแพทย์สั่ง
- เด็กอายุ 3-12 ปี ใช้ข้างละ 1 สูด วันละ 1 ครั้งหรือตามแพทย์สั่ง
- ศึกษาวิธีใช้เพิ่มเติมจากท้ายเอกสาร

3.2 หากลืมพ่นยาควรทำอย่างไร

- พ่นยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับการใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไป โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าพ่นยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากต้องพ่นยาข้างละสองครั้ง ควรพ่นยาข้างละ 1 ครั้งให้ครบทั้งสองข้างก่อน แล้วจึงเริ่มพ่นยาครั้งที่สองให้ครบทั้งสองข้าง
- ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่ง
- พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษา
- ห้ามหยุดยาเอง ยกเว้นได้รับคำแนะนำจากแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว
- จาม

- เลือดกำเดาไหล
- เจ็บคอ หรือเจ็บโพรงจมูก
- มีแผลในจมูก
- ติดเชื้อในทางเดินหายใจ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยามีอายุ 2 เดือนนับจากเปิดใช้ครั้งแรก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยานี้เป็นยาน้ำแขวนตะกอน สีขาวถึงสีขาวออกเหลือง สำหรับพ่นจมูก
- ตัวยาสำคัญ** โมเมทาโซนฟูโรเอต (mometasone furoate)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ benzalkonium chloride (เบนзалโคเนียมคลอไรด์), glycerol (กลีเซอรอล), polysorbate 80 (โพลีซอร์เบต 80), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสทัลลีนเซลลูโลส), carmellose sodium (คาร์เมลโลสโซเดียม), citric acid monohydrate (ซิตริกแอซิดโมโนไฮเดรต), sodium citrate (โซเดียมซิเตรต), น้ำ (purified water)

ผู้ผลิต FARMEA ประเทศฝรั่งเศส

ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2567
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://ndi.fda.moph.go.th/)

▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อแนะนำวิธีการใช้ยาพ่นจมูก

1. กำจัดน้ำมันออกจากจมูกให้หมด (ถ้ามี) แล้วล้างมือให้สะอาด
2. เช็ดเยื่อจมูก ขวดยา เปิดฝาครอบขวดยา และถอดปลอกพลาสติกที่ครอบขวดยาออก
3. นั่งตัวตรง ตั้งศีรษะตรง ก้มศีรษะเล็กน้อย หายใจออกช้า ๆ
4. ใช้มือข้างที่ถนัดจับขวดยา สอดปลายที่พ่นยาเข้าไปในรูจมูกข้างใดข้างหนึ่ง ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร โดยให้ปลายหลอดชี้ไปทางผนังด้านข้างจมูก และหันออกจากผนังกันช่องจมูก
5. ปิดรูจมูกข้างที่เหลือโดยกดเบา ๆ บนปีกจมูกด้วยนิ้วมืออีกข้าง สูดหายใจเข้าช้า ๆ พร้อมกับกดที่พ่นยาเข้าจมูก
6. จากนั้นกลืนหายใจประมาณ 2-3 วินาทีและหายใจออกทางปาก
7. พ่นยาในรูจมูกอีกข้างโดยปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ 4-6 (ถ้าต้องพ่นยา เข้าจมูกทั้งสองข้าง)
8. เช็ดทำความสะอาดปลายที่พ่นยา ปิดฝาเก็บให้เรียบร้อย

ที่มา คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะรวม) พ.ศ. 2562

