

เฟกโซเฟนาดีน

ความแรง 180 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

ชื่อการค้า MILLIFEX 180
(มิลลิเฟ็กซ์ 180)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เฟกโซเฟนาดีนไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride) มีตัวยา 180 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการต่างๆจากการแพ้ เช่น น้ำมูกไหล ตาแดง คันตา คันจมูก ในโรคเยื่อจมูกอักเสบหรือไข้ละอองฟาง หรือเพื่อบรรเทาอาการแพ้บริเวณผิวหนัง เช่น ลมพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นๆ
 - อายุมากกว่า 65 ปี
 - ดับทำงานผิดปกติ
 - ไตทำงานผิดปกติ
 - เป็นโรคหัวใจ หรือหัวใจทำงานผิดปกติ
 - หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือหญิงที่กำลังให้นมทารก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
- กินยาตอนท้องว่าง หรือก่อนมีอาหาร 1 ชั่วโมง

3.2 หากมีอาการยาควรทำอย่างไร

กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้ง ไม่ต้องกินยาที่ลืม ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- เมื่อกินยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ในบางคน หากกินยาแล้วมีอาการง่วงซึม ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ไม่ควรกินร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจุดตามผิวหนัง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว
- เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง ง่วงซึม
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง ท้องเสีย
- ใจสั่น

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรกินยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน เรียบทั้งสองด้าน
- ตัวยาสีดำ เฟกโซเฟนาดีนไฮโดรคลอไรด์
- ส่วนประกอบอื่น ๆ

ส่วนเม็ดยา ได้แก่ ไมโครคริสตัลลินแซลลูโลส พีเอช 101, ฟิล์จลาติโนซีสตาร์ช, ครอสคัมเมิลโลสโซไซด์, เอทานอล, 'เอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส พีเอช 102, แมกนีเซียมสเตียเรท

ส่วนฟิล์มเคลือบ ได้แก่ ไฮโพรเมลโลส, น้ำ, โพวิโดน เค25, โพลีเอทิลีนไกลคอล 400, เททาเนียมไดออกไซด์, คอลลอยด์อล ซิลิโคน ไดออกไซด์, ไอออนออกไซด์เรด, ไอออนออกไซด์เยลโล

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย บริษัท มิลลิเมต จำกัด, จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 31 ตุลาคม 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- ยานี้อาจทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้อย่างไร ผู้ขับขี่ ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทำงาน ที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่า รับประทานยานี้แล้วไม่ง่วง
- ไม่ควรใช้ยาในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก สตรีให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน
- หากใช้ยานี้แล้วหัวใจเต้นผิดปกติ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต
- การใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่ม Macrolides เช่น erythromycin หรือยาต้านเชื้อรา กลุ่ม Imidazole เช่น ketoconazole จะทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร