

โทพิราเมท 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โท-พี-รา-เมท (topiramate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการชัก
- ใช้ป้องกันการปวดศีรษะไมเกรนในผู้ใหญ่

1.3 ห้ามให้ยานี้แก่ผู้รับประทาน เนื่องจากอาจเป็นอันตรายแม้ผู้รับมีอาการคล้ายกัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- หญิงตั้งครรภ์ หรือมีความเสี่ยงจะตั้งครรภ์ โดยไม่ได้คุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หากผู้ใช้ยามีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- โรคไตหรือมีปัญหากับไต โดยเฉพาะโรคไตที่ไตและกำลังฟอกไต
- ดื่มน้ำมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติ
- ดวงตา หรือ การมองเห็นมีปัญหา โดยเฉพาะต้อหิน
- มีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยาได้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- กินยาทั้งเม็ด
- ดื่มน้ำตามทุกครั้งหลังกินยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม แล้วกินต่อไปตามปกติ
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย** เพราะยาอาจเกินขนาด

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ห้าม**นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ห้าม**หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดี
- พบแพทย์**ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- คุมกำเนิด**หรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้ยานี้ เพราะยาอาจส่งผลเสียต่อทารกหากตั้งครรภ์
- การขับรถ** หรือ **ทำงานกับเครื่องจักร** เป็นสิ่งที่ท่านควรระวัง เพราะยานี้ อาจทำให้ง่วงหรือรู้สึกเพลียได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ซึมเศร้ามากผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ซึมเศร้า วิดกกังวล อารมณ์ผิดปกติ
- ไม่มีสมาธิ ผิดปกติด้านความจำหรือความคิด
- บัสสาวะผิดปกติ เจ็บเวลาบัสสาวะ
- ครั่นเนื้อครั่นตัว รู้สึกไม่สบายตัว
- ง่วงซึม มึนงง รู้สึกเพลีย
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย น้ำหนักลดลง

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยานี้มีตัวยาโทพิราเมท มี 3 ความแรง ดังนี้
ชื่อการค้า เอพาเมท 25: เป็นเม็ดสีขาว กลมมนูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งของเม็ดยามีตัวอักษร V1
ชื่อการค้า เอพาเมท 50: เป็นเม็ดสีเหลืองอ่อน กลมมนูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งของเม็ดยามีตัวอักษร V3
ชื่อการค้า เอพาเมท 100: เป็นเม็ดสีเหลือง กลมมนูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งของเม็ดยามีตัวอักษร V4

1.3.1 ส่วนประกอบในตำรับ: Mannitol, Pregelatinised maize
1.3.1.1 Starch, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose
1.3.1.1 Sodium, Colloidal anhydrous Silica, Magnesium
1.3.1.1 Stearate

ผู้ผลิต Balkanpharma – Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
Dupnitsa
Bulgaria

ผู้นำเข้า บริษัท สีสลมการแพทย์ จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 กันยายน 2562

Package Leaflet - Topiramate P/L TH