

# วัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 4 สายพันธุ์

## ชนิดน้ำแขวนตะกอน

### ขนาด 0.5 มิลลิลิตรต่อไซริงค์

#### VaxigripTetra (วาซิกริปเตตรา)

## 1. วัคซีนนี้คือวัคซีนอะไร

### 1.1 วัคซีนนี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- วัคซีนนี้มีชื่อสามัญว่า วัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 4 สายพันธุ์ (quadrivalent influenza vaccine, split virion, inactivated)

### 1.2 วัคซีนนี้ใช้เพื่ออะไร

- วัคซีนนี้ใช้เพื่อ ป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ ใน ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
- วัคซีนนี้มีผลป้องกันโรคไขหวัดใหญ่หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ และไม่มีผลในการป้องกันไขหวัดธรรมดา
- เมื่อให้วัคซีนนี้ขณะตั้งครรภ์จะช่วงป้องกันท่านและลูกในครรภ์นับจากวันคลอดจนถึงอายุ 6 เดือน

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้วัคซีน

### 2.1 ห้ามใช้วัคซีนนี้เมื่อไร

- เคยแพ้วัคซีนนี้ ไข่ เนื้อไก่ นิโอมัยซิน ฟอรัมาลดีไฮด์ หรือ ออกซิโดซีนอล-9 ซึ่งเป็น ส่วนประกอบของวัคซีนนี้
- มีไข้สูงหรือกำลังมีอาการป่วย ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนนี้ออกไปจนกว่าจะหายเป็นปกติ

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้วัคซีนนี้

- แจ้งแพทย์**หากท่านหรือลูกของท่านมีภาวะต่อไปนี้
  - เกล็ดเลือดต่ำ หรือ เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติในการหยุดเลือด เนื่องจากการฉีดวัคซีนอาจทำให้เลือดออกได้

- ภูมิคุ้มกันต่ำหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง
- เคยวูบหรือเป็นลม ก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีน เนื่องจากกลัวการฉีดยา
- หากท่านตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีนนี้
- วัคซีนนี้ใช้ได้ทุกระยะของการตั้งครรภ์
- วัคซีนนี้อาจไม่ได้ให้ผลป้องกันได้อย่างเต็มที่กับทุกคนที่ได้รับวัคซีน
- ทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือนที่เกิดจากมารดาที่ได้รับวัคซีนขณะตั้งครรภ์อาจไม่ได้รับการป้องกันทุกคน

## 3. วิธีใช้วัคซีน

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

**แนะนำฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง** ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร:

- เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 9 ปี:
  - เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน ให้ ฉีด 1 เข็ม ต่อปี
  - ไม่เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน ให้ฉีดเข็มแรก 1 เข็ม และฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป: ฉีด 1 เข็ม ต่อปี
- สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่ 1 เข็มขณะตั้งครรภ์ อาจป้องกันลูกของท่านตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 6 เดือน

### 3.2 หากลืมมารับวัคซีนควรทำอย่างไร

- ให้มาพบแพทย์เพื่อวางแผนในการฉีดวัคซีนใหม่

## 4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดวัคซีน

- ควรอยู่สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที
- แจ้งแพทย์หากท่านหรือลูกของท่าน ต้องตรวจเลือดหลังจากฉีดวัคซีน เพราะ วัคซีนอาจทำให้ผลการตรวจเลือดบางชนิดคลาดเคลื่อนได้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากวัคซีน

### 5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

**"รีบแจ้งหรือไปพบแพทย์ทันที"**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
- มีไข้ รู้สึกไม่สบาย
- มีอาการปวด บวม แดง และผิวหนังแข็งกระด้างบริเวณที่ฉีด

**"ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์"**

## 6. ควรเก็บวัคซีนนี้อย่างไร

- วัคซีนนี้จะเก็บที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเท่านั้น ท่านจะไม่ได้รับวัคซีนนี้กลับบ้าน
- เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 2-8 องศาเซลเซียส และเก็บไว้ในกล่องบรรจุเดิมเพื่อป้องกันแสง
- ห้ามแช่แข็ง

**ผู้ผลิต:** Sanofi Pasteur, Val de Reuil, French republic.

**ผู้นำเข้า:** บริษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**