

พินาไฟเบรต
ความแรง 0.1 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า PARMODIA® (พาร์โมเดียม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พินาไฟเบรต (pemafibrate)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาลดไขมันในเลือด

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ร่วมกับ การควบคุมอาหาร ในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติรวมถึง ภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคตับอย่างรุนแรง มีโรคตับแข็ง หรือถุงน้ำดีอุดตัน
- มีนิ่วในถุงน้ำดี
- ตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะตั้งท้อง
- กำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า ไซโคลสปอริน (cyclosporin) หรือยาฆ่าเชื้อที่ชื่อว่า ริแฟมปีน (rifampin)

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เป็นโรคตับ หรือเคยเป็นโรคตับ
- เป็นโรคไตระยะรุนแรง
- เคยมีนิ่วในถุงน้ำดี
- กำลังให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านไวรัส ยา ฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยาแก้อักเสบ

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิด และความรุนแรงของโรค

- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2. หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้ รอกินยาของมื้อถัดไป

- ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่ รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตาม คำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หญิงให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกในขณะที่ใช้ยานี้
- ควบคุมการกินอาหารประเภทไขมัน ควบคู่ไปกับการกิน ยานี้ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนึ่งหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว
- เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด
- คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้สูง ร่วมกับปวดท้องอย่างรุนแรง
“ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เจ็บคอ
- คันทา คันจุก จาม น้ำมูกใส
- คันผิวหนัง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควร เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** เป็นเม็ดสีขาว รูปร่างกลม ด้านหนึ่งมีคำว่า “Kowa 217” อีกด้านมีขีดแบ่งครึ่ง
- **ตัวยาสาคัญ** คือ พินาไฟเบรต
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ แลคโตสไฮเดรต, โครสคาเมลโลสโซเดียม, ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไฮโปรมีลโลส, ไตรเอทิลซิเตรต, ซิลิซิคแอซิด, โทเทเนียมออกไซด์, คาร์บูนาแวกซ์

ผู้ผลิต บริษัท โควา จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
ผู้นำเข้าบริษัท โควา (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<https://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

