

ทริปโทเรลีน
ความแรง 22.5 มิลลิกรัม
ชนิดผงสำหรับละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Diphereline® P.R. 22.5 mg
(ดิเฟอเรลีน 22.5 มิลลิกรัม)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่าทริปโทเรลีน (triptoreline) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมน
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วยผู้ชายที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้
 - ยานี้ใช้เพื่อรักษาภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- × ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้หรือยาอื่น ๆ ในกลุ่มฮอร์โมน
 - × ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- กำลังใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่
 - เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 - เป็นผู้ที่มีการหัวใจหรือหลอดเลือด รวมถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - เป็นผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในสมอง
 - ดื่มสุราหนัก สูบบุหรี่ หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน
 - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิด และความรุนแรงของโรค
 - ยานี้ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 6 เดือน
 - ยานี้ต้องให้โดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
- 3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร**
- ควรรีบติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
- 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- หากสงสัยว่าท่านได้รับยาเกินขนาดให้รีบแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ อาจทำให้เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย หรือตาพร่าได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - มีอาการชัก
 - ปวดศีรษะรุนแรง พุดไม่ชัด ชาหรืออ่อนแรงที่แขนขา
 - ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่ออก
 - การมองเห็นเปลี่ยนไป

“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- อาการในผู้ชาย:**
- รู้สึกอ่อนวูบวาบ
 - อ่อนเพลีย เหงื่อออกมาก
 - ปวดหลัง ปวดกระดูก ปวดขาเหมือนเข็มแทง
 - ความต้องการทางเพศลดลง อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
 - ปวดบวมแดง หรือมีรอยขีดบริเวณที่ฉีดยา
 - ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน
 - ตัวบวม น้ำหนักเพิ่ม
 - อาการเปลี่ยนแปลง ซึมเศร้า
 - เป็นสิ่ว ผมหงอก คันผิวหนัง

- อาการในเด็ก:**
- มีเลือดออกจากช่องคลอดในเด็กผู้หญิง โดยเฉพาะในเดือนแรกของการได้รับยา
 - เป็นสิ่ว
 - ปวดศีรษะ รู้สึกอ่อนวูบวาบ
 - น้ำหนักเพิ่ม
 - ปวดท้อง ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน
 - ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดยา
 - อาการเปลี่ยนแปลง ซึมเศร้า กระสับกระส่าย

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ยานี้เก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- หลังผสมยาแล้วควรใช้ทันที หรือใช้ภายใน 1 วัน โดยเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา**

ในกล่องยา 1 กล่อง ประกอบด้วย

1. ขวดแก้วใสบรรจุผงยาสีขาว ปิดด้วยจุกยางแล้ว ครอบทับด้วยฝาอะลูมิเนียม จำนวน 1 ขวด
2. ขวดแก้วใสบรรจุน้ำยาใส ไม่มีสี สำหรับละลาย ผงยา จำนวน 1 ขวด
3. กระบอกฉีดยา จำนวน 1 กระบอก
4. เข็มฉีดยา จำนวน 2 เข็ม

- **ตัวยาสำคัญ** ทริปโทเรลีน 22.5 มิลลิกรัม

- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่

โพลีไกลโคไลด์ แมนนิทอล ครอสมาร์เมลโลส โขเดียม โพลีซอร์เบต 80

ผู้ผลิต ดีไบโอฟาร์ม รีเสิร์ช แอนด์ แมนูแฟกเจอร์ส เอส.เอ.
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 สิงหาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**