

**แพนโทพราโซล**  
**ความแรง 40 มิลลิกรัม**  
**ชนิดผงสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า Pantoloc IV**  
**(แพนโทลอค ไอวี)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า แพนโทพราโซล (pantoprazole) เป็นยาในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้รักษา

- แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น
- แผลในกระเพาะอาหาร
- โรคกรดไหลย้อนร่วมกับเคยมีประวัติหลอดอาหารอักเสบจากกรด
- ภาวะการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากผิดปกติในกลุ่มอาการโซลลิงเกอร์-เอลลิสัน

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง
  - หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
  - ใช้ยาด้านการแข็งตัวของเลือด
  - กำลังใช้ยา อาหารเสริม สมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วย เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดหรือหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

**3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร**

- หากท่านสงสัยไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกร

**3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- หากท่านสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ใจสั่น การรับรู้ผิดปกติ สับสน ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล หรือแจ้งแพทย์ทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ไม่มีข้อมูล

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เป็นตะคริว
- กระดูกร้าว กระดูกหัก
- มีไข้ ติดเชื้อบริเวณที่ฉีดยา

**“หากมีอาการเหล่านี้  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

**5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล**

- ปวดท้อง ท้องผูก อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้
- นอนไม่หลับ มึนงง ปวดหัว

**“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- ลักษณะยา ผงยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด สีขาวถึงออกขาว บรรจุในขวดแก้วปิดด้วยจุกยาง
- **ตัวยาสําคัญ** แพนโทพราโซล 40 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ แมนนิทอล (mannitol)

ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด ประเทศไทย  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ธันวาคม 2563

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**