

อีดีอกซาเบน
ความแรง 15, 30 หรือ 60 มิลลิกรัม
ชนิดยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Lixiana® (ลิกเซียนา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า อีดีอกซาเบน เป็นยาในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ
- ใช้เพื่อรักษาการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำที่ขา หรือในปอด หรือป้องกันการกลับเป็นซ้ำของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำที่ขา หรือในปอด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- × ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังมีเลือดออกมากผิดปกติ
- × ห้ามใช้ในผู้ที่มีการตั้งครรภ์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกอย่างรุนแรง (เช่น แผลในกระเพาะอาหาร, อาการบาดเจ็บหรือมีเลือดออกในสมอง, เพิ่งผ่าตัดสมองหรือดวงตาเมื่อไม่นานมานี้)
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังใช้ยาอื่นเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ วาร์ฟาริน ดาบิกาเทรน โรวาร็อกซาเบน เอพิซาเบน หรือเฮพาริน

- × ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- × ห้ามใช้ในผู้ป่วยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันได้
- × ห้ามใช้ในหญิงกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะมีลูก
- × ห้ามใช้ในหญิงกำลังให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ใตวยาเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือต้องล้างไต
 - ใส่ลิ้นหัวใจเทียม
 - มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นสาเหตุให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด
 - กำลังจะมีการผ่าตัด
- เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

3.2 หากลืมนกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และกินยาเม็ดต่อไปในวันถัดไปตามที่กำหนด ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เลือดออกผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในระหว่างได้รับยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- เลือดออกมาก หรือน้ำหนักผิดปกติ เช่น เลือดออกในตา เลือดกำเดาไหล เลือดออกที่เหงือก ไอมีเลือดปน ปัสสาวะมีเลือดออก ประจำเดือนมาผิดปกติ
- อ่อนแรง อ่อนเพลีย เวียนหัว ปวดหัว บวมโดยไม่มีสาเหตุ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- รู้สึกไม่สบาย
- ปวดท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องนำ ห้องครัว

- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม มี 3 ความแรง
 - 15 มิลลิกรัม สีส้ม รูปกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.7 มม.) ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ "DSC L15"
 - 30 มิลลิกรัม สีชมพู รูปกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 มม.) ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ "DSC L30"
 - 60 มิลลิกรัม สีเหลือง รูปกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 มม.) ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ "DSC L60"
- ตัวยาสำคัญ
อีดีออกซาเบนโทซิเลต เทียบเท่ากับ 15, 30, 60 มิลลิกรัมของ อีดีออกซาเบน
- ส่วนประกอบอื่นๆ
 - แมนนิทอล (E421)
 - สตาร์ชพรีเจลาติไนซ์
 - ครอสโพรโโดน (E1202)
 - ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส(E463)
 - แมกนีเซียมสเตียเรท (E470b)
 - สารเคลือบฟิล์ม:ไฮโปรมะลอส (E464) แมกโคกอล (8000) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (E171) ทัลก์ (E553b) คาร์บอนแบล็ก ไอเออร์นออกไซด์แดง (E172) ไอเออร์นออกไซด์เหลือง (E172)

ผู้ผลิต

บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว ยุโรป จำกัด ประเทศเยอรมัน

ผู้นำเข้า

บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 24

เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กันยายน 2566
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร