

ฟีนีโทอินโซเดียม
ความแรง 50 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Dilantin® (Ready-Mixed)
(ไดแลนติน (ชนิดฉีด))

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ฟีนี-โท-อิน-โซ-เดียม (Phenytoin sodium) มีตัวยา 50 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
- เป็นยาในกลุ่ม ยากันชัก

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ควบคุมอาการชัก
- ใช้รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ยานี้ห้ามใช้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยากันชักชนิดอื่น
- มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจ
- กำลังใช้ยา ดีลาเวอร์ดีน (delavirdine)
- กำลังตั้งท้อง

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ความดันโลหิตต่ำ หรือมีโรคหัวใจ
- มีโรคตับหรือโรคไต
- มีโรคเบาหวาน
- มีโรคเกี่ยวกับระบบเลือดที่ชื่อว่า พอร์ไฟเรีย (porphyria)
- ต้มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก หรือมีภาวะติดแอลกอฮอล์
- กำลังได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีที่ศีรษะ
- มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
- วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน
- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือหยดเข้าหลอดเลือดดำเท่านั้น

3.2. ถ้าลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าท่านไม่ได้รับยาตามปกติ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

3.3. ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากได้รับยานี้ เนื่องจากยานี้อาจจะทำให้เวียนหัวหรือง่วงนอนได้
- ผู้ป่วยหญิงควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการคุมกำเนิดระหว่างที่ใช้ยานี้
- งดให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ต่อมในร่างกายบวมโต ปวดข้อ ข้ออักเสบ
- ผิวหนังเปลี่ยนสี ปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีดยา แล้วกระจายลงไปที่แขนและนิ้วมือ
- มีจ้ำเลือด มีไข้ ผิวหนังช้ำ มีอาการเจ็บคอรุนแรง
- มึนงง สับสน พุดไม่ชัด สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลงไป มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
- การเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ ทรงตัวลำบาก ตัวสั่น เหนื่อยถี่ว่ลำบาก การเคลื่อนไหวของดวงตาผิดปกติ

“รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2. อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวด ผิวหนังหลุดลอก บริเวณที่ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก
- มึนงง ง่วงซึม เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ
- กระวนกระวาย กล้ามเนื้อกระตุก การรับรู้รสเปลี่ยนแปลงไป
- ริมฝีปากหรือเหงือกขยายใหญ่ขึ้น
- ขนที่ร่างกายหรือใบหน้าเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งเป็นอาการแสดงของตับทำงานผิดปกติ

“ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้จะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาล โดยทั่วไปแล้วท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน
- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** สารละลายใส ไม่มีสี บรรจุในหลอดแก้ว ปริมาตร 5 มิลลิลิตร
 - **ตัวยาสำคัญ** คือ ฟีนีโทอินโซเดียม ความแรง 50 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
 - **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ โพลีพีนโกลคอล (propylene glycol) เอทานอล (ethanol) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) และน้ำ
- ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgium
ผู้นำเข้า บริษัท เวียร์ทริค (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 14 มิถุนายน 2566
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรถ่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
5. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
6. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
7. เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ไข้ ผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง มีการหลุดลอกของผิวหนังและบริเวณเยื่อต่าง ๆ เช่น ในช่องปาก ล้าคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อตาอักเสบ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น Steven-Johnson syndrome

PIL Revision no: 2.2 (Puurs, Belgium)

PIL date: June 14, 2023

Country: Thailand