

ออนแดนซีทรอน

ความแรง 2 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า **ONDRAN (ออนแดน)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ออน-แดน-ซี-ทรอน (ondansetron) มีตัวยาออนแดนซีทรอน 2 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มแก้อาเจียน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ควบคุมอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดและการรักษาด้วยรังสี
- ยานี้ใช้ป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ร่วมกับอะโปมอร์ฟิน
- เคยแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ผู้ป่วยโรคหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - เคยมีประวัติแพ้ยาที่คล้ายกัน เช่น แกรนิซิดรอน พาโลโนซิดรอน
 - ดับทำงานผิดปกติ
 - ล่าช้าทำงานผิดปกติ หรือสำไส้อุดตัน
 - มีระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ เช่น โพแทสเซียม โซเดียม แมกนีเซียม
 - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
 - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง

“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยา หรือมีอาการใดที่มีผลต่อการรักษา โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดหรือหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ และฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

3.3 หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ยาออนแดนซีทรอน อาจทำให้เวียนหัว และตาพร่าได้ จึงไม่ควรขับขียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- อาการชัก การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ อาการอื่น

“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ปวดหัว
 - รู้สึกอ่อน วูบวาบ
 - ท้องผูก
 - ระคายเคืองหรือบวมแดงบริเวณที่ฉีดยา
- “ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา นํ้ายาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด ใส่ไม่มีสี
- ตัวยาสําคัญ ออนแดนซีทรอน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ กรดซิตริก แอนไฮดรัส, โซเดียมซिटเรทแอนไฮดรัส, โซเดียมคลอไรด์, นํ้าสำหรับฉีด

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท มิลลิเมต บีเอฟเอส จำกัด

174, 179 หมู่ที่ 8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย

จังหวัดเชียงราย 57210

Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 26 เมษายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร