

โซเดียม วาลโพรเอท
ความแรง 100 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
สารละลายสำหรับฉีดหรือ
หยดเข้าหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Valproxa (วาลโพรซา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า โซเดียม วาลโพรเอท (Sodium Valproate) เป็นยาในกลุ่มยาต้านอาการชัก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาอาการชักในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยาต้านอาการชัก
- ⊗ เป็นโรคตับ
- ⊗ เป็นโรคพอร์ไฟเรีย (โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการสร้างฮีโมโกลบิน)
- ⊗ หญิงมีครรภ์ หรือมีความประสงค์จะตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคเบาหวาน
 - เป็นโรคไต
 - เป็นหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของวัฏจักรยูเรีย (Urea Cycle Disorder)
 - ใช้น้ำสมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่เพราะอาจมีผลต่อการรักษา
 - ดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีภาวะติดแอลกอฮอล์

- มีวางแผนการคุมกำเนิด
 - เคยมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย
- “สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีการใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ให้ยานี้กับท่านโดยหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันทีที่นึกขึ้นได้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มึนงง กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบาก หรือหมดสติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชี่ขานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเพราะยาอาจทำให้วังงซึม มึนงง หรือหน้ามืด
- ยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดด ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน
- ผู้ป่วยหญิงควรปรึกษาแพทย์เรื่องการคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มือและเท้าบวม
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- ผมรัว
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- มีความคิด และพยายามที่จะฆ่าตัวตาย

**“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- น้ำหนักตัวเพิ่ม อยากรกินอาหารบ่อย
- ไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว

**“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- โดยทั่วไปยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากท่านได้รับยานี้กลับบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้
 - เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
 - ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
 - ห้ามใช้หลังวันหมดอายุที่ระบุบนฉลากและบนกล่องยา

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น้ำยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด ใส ไม่มีสี
- ตัวยาสำคัญ โขเดียม วาลโปรเอท
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ โขเดียมไฮดรอกไซด์, ไฮโดรคลอริก แอซิด และน้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน
มหาสารคาม 44160

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 มกราคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ขณะใช้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับโรคไต

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**