

ริเมจีแพนท
ความแรง 75 มิลลิกรัม
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก
ชื่อการค้า เนอร์เทค โอดีที
(NURTEC ODT)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ริเมจีแพนท (Rimegepant) มีตัวยาริเมจีแพนท 75 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มแคลซิโทนิน ยีนรีเลทด์เปปไทด์ (CGRP)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาและป้องกันอาการปวดไมเกรนกำเริบในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ แพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้ (ดูหัวข้อ 7 ส่วนประกอบอื่น ๆ)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตับรุนแรง
 - หากท่านมีการทำงานของไตลดลงหรือกำลังฟอกไต
- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในช่วงอายุนี้นี้
- หากตั้งครรภ์ คิดว่าอาจตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะมีบุตร ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนได้รับยานี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากยังไม่ทราบผลของยานี้ต่อสตรีมีครรภ์
- หากกำลังให้นมบุตร หรือมีแผนจะให้ให้นมบุตร ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนได้รับยานี้

การใช้ยาอื่นร่วมกับเนอร์เทค โอดีที

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านกำลังได้รับยาอื่นหรือเคยได้รับยาอื่น หรืออาจได้รับยาอื่นอยู่ เนื่องจาก

ยาอื่นอาจมีผลต่อการทำงานของยาเนอร์เทค โอดีทีหรือยาเนอร์เทค โอดีทีอาจมีผลต่อการทำงานของยาอื่น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการยาที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อได้รับเนอร์เทค โอดีที

- ไอทราโคนาโซลและแคริโทรมัยซิน (ยารักษาโรคติดเชื้อรา/เชื้อแบคทีเรีย)
- ริโทนาเวียร์และเอพฟาเวเรนซ์ (ยารักษาโรคติดเชื้อ HIV)
- โบเซนแทน (ยารักษาความดันเลือดสูง)
- เซนต์ จอห์นส์เวิร์ต (ยาสมุนไพรรักษาซึมเศร้า)
- ฟิโนบาร์บิทอล (ยารักษาลมชัก)
- ไรแฟมพิซิน (ยารักษาวัณโรค)
- โมตาฟนิล (ยารักษาโรคลมหลับ)

ห้ามกินยาเนอร์เทค โอดีที มากกว่าหนึ่งครั้งทุก 48 ชั่วโมงรวมกัน

- ฟลูโคนาโซลและอีริโทรมัยซิน (ยารักษาโรคติดเชื้อรา/เชื้อแบคทีเรีย)
- ดิลไทอะเซม ครินดิน และเวราพามิล (ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก หรือความดันโลหิตสูง)
- ไซโคสปอริน (ยาป้องกันการปฏิเสธอวัยวะหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- เนอร์เทค โอดีทีสามารถละลายในปาก และสามารถกินร่วมกับหรือไม่ร่วมกับมื้ออาหารหรือน้ำก็ได้
- สำหรับการป้องกันอาการปวดไมเกรน ขนาดยาที่แนะนำคือ หนึ่งเม็ด ละลายในปาก (ริเมจีแพนท 75 มิลลิกรัม) วันเว้นวัน
- สำหรับการรักษาอาการปวดไมเกรนเมื่ออาการกำเริบแล้ว ขนาดยาที่แนะนำคือ หนึ่งเม็ด ละลายในปาก (ริ

เมจีแพนท 75 มิลลิกรัม) ตามต้องการ ไม่เกินวันละหนึ่งครั้ง

- ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ หนึ่งเม็ด ละลายในปาก (ริเมจีแพนท 75 มิลลิกรัม) ต่อวัน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากท่านใช้เนอร์เทค โอดีที เพื่อป้องกันอาการปวดไมเกรนและลืมกินยา ให้กินยาในครั้งต่อไปตามปกติอย่ากินยาเพิ่มเอง

3.3 หากกินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหรือไปโรงพยาบาลในทันที นำกล่องยาและเอกสารกำกับยานี้ไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามกำหนดการนัดตรวจเป็นประจำ เพื่อตรวจติดตามการรักษาหรือผลของยาที่มีอันตรายใด ๆ
- คาดว่ายาเนอร์เทค โอดีที ไม่มีผลต่อการขับขี่หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- อาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายวันหลังได้รับยา "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้
- "ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมาเพื่อป้องกันความชื้น และเมื่อดยออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนกินเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- อย่าใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่องหรือแผง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สีขาวถึงสีขาวนวล เม็ดกลม และมีรอยสัญลักษณ์
 - **ตัวยาสําคัญ** ริเมจีแพนท
 - **ส่วนประกอบอื่น ๆ** เจลาติน แมนนิทอล สารแต่งรสมันท์ ซุคราโลส
 - **ผู้ผลิต** Catalent UK Swindon Zydis Limited
ประเทศสหราชอาณาจักร
- ผู้นำเข้า บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 กันยายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**