

ไซโปรฟลอกซาซิน
ความแรง 2 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับหยดเข้า
หลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Ziproxa IV (ซีโปรซา ไอร์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม ต่อ 50 มิลลิลิตร, 200 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร, 300 มิลลิกรัม ต่อ 150 มิลลิลิตร และ 400 มิลลิกรัม ต่อ 200 มิลลิลิตร เป็นยาปฏิชีวนะ กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่
 - การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
 - การติดเชื้อของผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง
 - การติดเชื้อของกระดูกและข้อต่อ
 - การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ
 - การติดเชื้อในช่องท้อง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

[X] เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน ได้แก่ ยาในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน เช่น นอร์ฟลอกซาซิน ลีโวฟลอกซาซิน โอฟลอกซาซิน มอกซิฟลอกซาซิน และซีตาฟลอกซาซิน

[X] ใช้รักษาร่วมกับยาที่ขานินดิน

[X] หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - โรคลมชัก หรือมีความผิดปกติทางสมองและอาจทำให้ชักได้ง่ายขึ้น
 - โรคตับ โรคไต
 - ท้องเสีย จากการใช้ยาอื่นอีกเสบ
 - โรคเบาหวาน
 - โรคที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ จี-6-พีดี
 - โรคหัวใจเต้นผิดปกติ
 - โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดรุนแรง
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาเหล่านี้ ได้แก่ วาฟาริน • ไซโคสโปริน • ซีโอฟิลลีน เป็นต้น เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาหรืออันตรายได้

“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยา หรือมีอาการใดที่มีผลต่อการรักษา โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีการใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ให้ยานี้กับท่านโดยหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันทีที่นึกขึ้นได้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น ท้องเสียรุนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือชัก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเพราะยาอาจทำให้ปวดหัว อ่อนเพลีย
- ยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดด ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือและข้อเท้า
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- วิดกกังวล ซึมเศร้า ประสาทหลอน
- ชัก

“หากมีอาการเหล่านี้ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง
- ปวดหัว อ่อนเพลีย
- ปวดบริเวณที่ฉีด

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- โดยทั่วไปยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากท่านได้รับยานี้กลับบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้
 - เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
 - ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
 - เก็บให้พ้นแสง
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
 - ห้ามใช้หลังวันหมดอายุที่ระบุบนฉลากและบนกล่องยา

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** น้ายาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด ใส ไม่มีสี ถึงสีออกเหลือง
- **ตัวยาสำคัญ** โซโพรฟลอกซาซินแลคเตท
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แลคติกแอซิด, โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์, ไฮโดรคลอริกแอซิด และน้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน
มหาสารคาม 44160

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ตุลาคม 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่มควิโนโลนตัวอื่นๆ
2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือหรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับไตได้
5. ไม่ควรใช้ยานี้ หรือหากจำเป็นให้ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งง่ายต่อการเกิดอาการชัก โดยสัมพันธ์กับขนาดยาที่ให้
6. ระมัดระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ถูกเปลี่ยนแปลงผ่านระบบเอนไซม์ **cytochrome P450 1A2** เช่น **theophylline, Methylxanthine, caffeine** เพราะอาจจะเกิดอันตรกิริยา (drug interaction) ต่อกันมีผลให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นจนเกิดอันตรายได้
7. อาจพบภาวะผิดปกติของระบบเลือด รวมทั้งการกดไขกระดูก หากพบควรหยุดยาทันที และการใช้ยานี้ร่วมกับ **warfarin** อาจจะเพิ่มฤทธิ์ของ **warfarin**
8. ยานี้อาจทำให้เกิดผื่นแพ้แสงแดด (phototoxicity reaction) หรือผื่นชนิดรุนแรง เช่น **Toxic Epidermal Necrolysis, Steven-Johnson syndrome, Erythema Multiforme** เป็นต้น
9. ยานี้อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือด ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**