

เซเวลามเมอร์ คาร์บอเนต 800 มิลลิกรัม

ชนิดผงแห้งสำหรับเตรียม

ยาน้ำแขวนตะกอน

ชื่อการค้า Renvela Powder (เรนวีล่า)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เซเวลามเมอร์ คาร์บอเนต (sevelamer carbonate) มีตัวยา 800 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มจับฟอสเฟต

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อควบคุมระดับฟอสฟอรัสในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีระดับฟอสเฟตในเลือดต่ำ
- มีภาวะลำไส้อุดตัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - มีความผิดปกติของการกลืน
 - ลำไส้เคลื่อนไหวผิดปกติรุนแรง
 - ท้องผูกรุนแรง
 - ลำไส้อักเสบ
 - เคยได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือลำไส้
 - ใช้ยาซีโปรฟลอกซาซิน (ยาฆ่าเชื้อ) หรือกำลังใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจ หรือโรคลมชัก
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยา
 - กินยาครั้งละ 1-2 ชอง วันละ 3 ครั้ง พร้อมอาหาร
 - แพทย์อาจปรับขนาดยาในระหว่างการรักษา
- วิธีผสมยา
 - วิธีที่ 1: เทผงยาลงในถ้วยตวง และผสมกับน้ำประมาณ 30 มิลลิลิตร **หรือ**
 - วิธีที่ 2: ผสมผงยากับอาหารจำนวนเล็กน้อย **หรือ**
 - วิธีที่ 3: ผสมผงยากับเครื่องดื่มจำนวนเล็กน้อย จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี และดื่มหรือกินส่วนผสมที่เตรียมทั้งหมดภายใน **30 นาทีหลังผสมยา**
- ข้อห้ามในการผสมยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ห้ามนำผงยาไปอบ (เช่น ในไมโครเวฟ) หรือผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มร้อน หรือนำอาหารที่ผสมยาแล้วไปอุ่นหรือให้ความร้อน

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดท้องอย่างรุนแรง หรือมีเลือดปนในอุจจาระ

ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ เช่น

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องช่วงบน ท้องผูก
- ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ปวดท้อง ไม่สบายท้อง

ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ควรไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมาเพื่อป้องกันแสง
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
- **ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว**
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ผงยาสีเหลืองอ่อนปราศจากอนุภาคแปลกปลอมสำหรับเตรียมยาน้ำแขวนตะกอน
- ตัวยาสำคัญ เซเวลามเมอร์ คาร์บอเนต 800 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ สารแต่งกลิ่นรสส้ม, โพรพิลีนไกลคอล อัลจีเนต, ผงเกลือแกง, ซูคราโลส และเฮล็กออกไซด์ (สีเหลือง)

ผู้นำเข้า

บริษัท ชานอฟี-อเวเนตีส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 มกราคม 2563

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร