

**ด็อกซาโซซินเมซึเลต  
ความแรง 4 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด แบบออกฤทธิ์ยาวนาน  
ชื่อการค้า Cardura™ XL  
(คาร์ดูรา™ เอ็กซ์แอล)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ด็อก-ซา-โซ-ซิน-เม-ซี-เลต (Doxazosin mesylate) มีตัวยา 4 มิลลิกรัม
- เป็นยาในกลุ่ม อัลฟา-บล็อกเกอร์

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
- ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโต

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1. ยานี้ห้ามใช้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่มควินาโซลิโนน
- มีโรคต่อมลูกหมากโตร่วมกับความดันโลหิตต่ำ
- เคยมีภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อมีการเปลี่ยนท่า
- มีโรคต่อมลูกหมากโตร่วมกับทางเดินปัสสาวะอุดตัน มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้ในทางเดินปัสสาวะ
- ไม่สามารถกลืนปัสสาวะได้หรือปัสสาวะออกน้อย

#### 2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคตับ
- มีโรคหัวใจ
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้สามารถกินตอนท้องว่างหรือพร้อมกับมื้ออาหารก็ได้
- กลืนยาทั้งเม็ดห้ามตัด แบ่ง บดหรือเคี้ยวเม็ดยา

#### 3.2. ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามยาเม็ดที่ลืมไปกินยาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

#### 3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้ หากมีอาการผิดปกติ

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังการเริ่มยา เนื่องจากยานี้อาจจะทำให้อ่อนเพลียหรือวิงเวียนได้
- หากมีอาการหน้ามืดหรือจะเป็นลมให้นั่งหรือนอนพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น
- แจ้งแพทย์ของท่านว่ากำลังใช้ยานี้ หากท่านกำลังจะเข้ารับการรักษาตัวหรือจะ
- อาจจะมีบางสิ่งคล้ายเม็ดยาปนออกมาบ้างอาจจะได้เนื่องจากเม็ดยาถูกออกแบบมาพิเศษให้ออกฤทธิ์ยาวนานซึ่งจะมีบางส่วนที่ไม่ถูกดูดซึมในร่างกาย

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
  - แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ออก ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
  - เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น หัวใจวาย
  - ตัวเหลือง ตาเหลือง
  - อวัยวะเพศแข็งตัวค้างและมีอาการปวด
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- วิงเวียน ปวดหัว เวียนหัวบ้านหมุน
- เหนื่อย ซ้อเท้า นิ้ว บวม
- ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ปากแห้ง
- คัดจมูก ไอ น้ำมูกไหล ติดเชื้ในทางเดินหายใจ
- ติดเชื้ในทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กลั้นปัสสาวะไม่ได้
- สมรรถภาพทางเพศลดลง
- ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** เม็ดกลมมน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีรูและสัญลักษณ์ “CXL 4”
- **ตัวยาสำคัญ** คือ ด็อกซาโซซินเมซึเลต 4 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ โพลีเอทิลีนออกไซด์ (polyethylene oxide), โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride), ไฮโปรมेलโลส (hypromellose), เฟอริกออกไซด์ (ferric oxide), แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate), เซลลูโลสอะซิเตต (cellulose acetate), มาโครกอล (macrogol)

ผู้ผลิต Pfizer Pharmaceuticals LLC, Puerto Rico  
ผู้แบ่งบรรจุ Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH , Germany

ผู้นำเข้า บริษัท เวียร์ทริส (ประเทศไทย) จำกัด  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 14 มิถุนายน 2566

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.**

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
<http://ndi.fda.moph.go.th/>

PIL Revision no: 1.4  
PIL date: June. 14 2023  
Country: Thailand